



BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III

XXXIV

D

82

NAPOLI

MODO FACILE E CHIARO.

PER COSTRUIRE

Tutte l' Equazioni indeterminate del secondo grado

DE' LUOGHI

ALLE SEZIONI CONICHE

A' GIOVANI STUDIOSI DELL' ANALISI

E S P O S T O

E D

ALL' ECCELLENZA DEL SIGNOR *Kev.*

LORENZO FRANCESCO II.

M O R O S I N I

PROCURATOR DI SAN MARCO

D E D I C A T O

D A M E L C H I O R E G R I F F I

L E N D I N A R E S E

Accademico in Rovigo di Architettura Militare.



IN VFRONA, MDCCLX.

PER DIONIGIO RAMANZINI LIBRAJO A S. TOMIO,
CON LICENZA DE' SUPERIORI,



ECCELLENZA



*A ragione, che m'inducesse sopra d'ogni al-
tra a procurarmi l'invidiabile onore, che la presente mia Operet-
ta comparisse alla luce fregiata de' gloriosi auspicj di VOSTRA*

* 2.

EC-

ECCELLENZA, non ha mestieri, che quì da me si manifesti. Ognuno certamente che viva, non dirò tanto sotto di questo felicissimo Cielo Veneto, ma dovunque ei sia, purchè capace d'intendere i chiari nomi di Virtù e di Gloria, saprà ridirmi, che per essere un ben giusto diritto delle Scienze tutte di ricovrarsi sotto il favore e la protezione de' Grandi, ho io così studiato felicemente, ricorrendo all' E. V., di sostenere collo splendido e saldo merito di un tale e tanto Mecenate la debolezza della mia Opera. Ora sebbene di un così onorato giudizio, ch' Ella riscuote meritamente da un Pubblico ammiratore dell' egregie e singolari sue doti, assaiissimo io mi compiaccio, e attribuisco a mia gran sorte, pur nonostante la supplico, a non isdegnare di acconsentirmi graziosamente che io possa dirle altresì, non essere stato questo l'unico scopo a che io mirassi nell'intitolarle questa mia tenue fatica. Egli è vero, che nell'ampio e prezioso cumulo de' suoi pregi mirando, e questi esimi tutti scorgendoli e maravigliosi, aveva io onde atterrirmi dallo splendore della sua Dignità, veggendola in Lei sì ben decorata e sostenuta da tanti e sì preclari meriti suoi nell' Augusta sua Patria. Ma siccome per grandi e pellegrine che mi sembrassero coteste sue Qualità, come la vastità
e pe-

e penetrazion di sua mente , la sagace destrezza , la diligenza , la circospezione , il maturo consiglio , la costanza , la fede , l'incorrutta giustizia , la decorosa magnificenza e gravità , e le tant' altre che V. E. o derivò , o seppe sì vivamente ricoprire da' suoi grand' Avi ; veggendo io però queste sue rare doti intese tutte a servire una trall' altre da V. E. più favorita e più diletta Virtù , alla quale io pure mi lusingava che non avesse a disdirsi in tutto l'offerta di questo qualunque sia lavoro del mio ingegno ; quindi fu , che io mi feci animoso ad implorare presso la benignissima condiscendenza dell' E. V. , che questa mia Operetta potesse aver la gloria di portare in fronte il suo chiarissimo Nome . Questa Virtù poi , che io già la veggio arbitra appieno e regolatrice del suo gran Cuore ; Virtù benefica e generosa tutta propria de' magnanimi Eroi , che quali Astri di primo lume non s' appagano punto di quella luce di che sfavillano a gran dovizia , se non in quanto la partecipano altrui , mi pare di averla già bastantemente indicata , essere appunto il suo infatigabile zelo per il pubblico BENE ; Virtù a cui V. E. deve la sua gloria , e cotesta sua ragguardevolissima Dignità ; dalla quale tanto onore a Lei ne deriva , che l' ha sì ben meritata ,
quan

quanto ne riscuote la sovrana Mente della Serenissima sua Patria, che glis' ha conferita. A cotesta pertanto sua premura della pubblica Felicità ho io. quì inteso di rendere quell' onore che maggiore per me si è potuto; e corì di dare al mondo nel tempo stesso, come ora faccio, un pubblico testimonio, e un perpetuo attestato verso l'E. V. della mia riverente offeranza, e rispettosissima servitù. Nè io posso dubitare, Ecc^{mo} Sig^{ra}, che questa mia divota riconoscenza non abbia ad essere dalla singolarissima sua Umiltà, anzi che sdegnata, benignamente gradita; non potendo Ella ignorare il sommo vantaggio che ne ridonda alla Civil. Società dalle Matematiche, massimamente poi se vengano queste, come ho io inteso in questa parte di fare, proposte in modo, che possa ezìandio di per se stessa, imprenderne l'arduo studio, anche la non molto esperata gioventù; la quale V. E. non solo ora ricerca per l'onorifico impiego di RIFORMATOR che sostiene, che non trascurisi, ma desidera ancora in ogni tempo, che abbiasene tutta la più sollecita e pietosa cura. E quì sono certo che altri, che ricevuto avesse un tanto onore, quale V. E. per un tratto finissimo di sua degnazione si è compiacciata di fare a me, volendosene in qualche modo dimostrare riconoscente e grato, en.

entrerebbe tosto ad annoverare i segnalati suoi meriti per le cospicue Cariche in cotesta inclita Dominante , e per le rilevantissime e gelose Deputazioni presso le più splendide e rinomate Corti di Europa , con tanto suo decoro , e sì gran vantaggio del pubblico Bene da V. E. sostenute : sono certo altresì , che , avendone sì ampia copia dalla Veneta Storia , non si rimarrebbe già di accennare almeno della nobilissima sua Prosapia alcuno di que' grandi Esemplari in ogni maniera di Civile e Cristiana virtù celebratissimi ; e quindi agevolmente passerebbe a lodare l' E. V. , non già perchè Ella sia da tali e così illustri Progenitori discesa ; ma perchè co' nobili suoi sudori gli ha espressi in Lei sì vivamente , intanto che ben distinguere non si potesse , se più Ella dalla gloria di Loro , oppure Essi da cotesta sua propria vengano decorati . Io però che conosco assai bene la virtuosa indole dell' animo suo , tanto schivo di sentire le proprie lodi , quanto vago di meritarse , le trapasso volentieri sotto silenzio ; che così mostro di rispettare , e di esser grato insieme quanto più posso alla sua modestia e moderazione ; da cui pur riconosco la speranza , che V. E. , non isdegnando ora questo qualche sia scarso tributo della mia verace stima , non isdegni altresì di pormi
fot.

sotto la sua validissima protezione . . . Onde io quì senza più ,
implorandole da Dio primo fonte della vera felicità , lungbis-
sima e prosperosa vita a compimento de' magnanimi suoi deside-
rj , dacchè indirizzati tutti sono a conservare , e vie maggior-
mente amplificare la gloria , e l'eterna fama di cotesta sag-
gia e possente Repubblica , asilo veramente e sostegno della pub-
blica felicità , con ossequiosissima venerazione inchinandola ,
mi pregio , e mi pregerò sempre dell'onore di essere

Di Vostra Eccellenza

Londinara li 29. febbrajo 1760.

Suo Obblig.^{mo} Dilett.^{mo} Oss.^{mo} Servitor vero
Melchiorè Griffi.

P R E.

PREFAZIONE.



NON fu mai data per avventura in luce Opera alcuna di Matematica, la quale più giustamente di questa mi adesse dal proprio Autore la Prefazione. E a vero dire, avendo io quì intrapreso in un Secolo sì ingombro e fazio di tanti Libri, e sì vago in tutto di novità, a trattare una materia, nella quale, non solo i mezzani, ma eziandio i più solenni e gran Maestri d'Analisi si esercitarono in modo, che questa parte omai abbiassi generalmente da' Professori per già compiuta e perfetta;

* *

ta;

ta; chi vi farà pertanto che proceder voglia con meco sì cortesemente, che inveggendo il titolo del mio Libretto, tosto non lo disprezzi, e non istimi ancora l'Autore che lo compose, assai malavveduto, e presuntuoso? Nullaostante io non diffido, qualora quì venga esposto il mio intendimento, non solo di potermi sottrarre da questo biasimo, ma che il Pubblico più sensato abbia forse da ricevere in buon grado questa mia fatica. E primieramente, io non intendo già, proposto avendo quella *Maniera di costruire l'Equazioni indeterminate &c.*, di detrar punto di quella immortal lode, che meritamente in ciò s'acquistarono co' loro ingegnosiissimi ritrovamenti tanti chiarissimi Matematici, come se difettuosi e mancanti fossero i loro metodi, o fallaci le lor dottrine. Infatti io non potrei giammai lusingarmi di aver conseguito il fine che mi sono proposto, se dagli Autori più rinomati (e tra questi mi pregio di far quì onorata e giusta memoria del Marchese dell'*Opital*, e di *Madama Agnesi*) io non avessi appreso tanti bei lumi, onde rendere utile e pregevole questo mio lavoro. Ma se io dicessi altresì, che siccome egli è proprio de' grandi e sublimi intelletti l'essere di tanto brevi e concisi nell'espressioni, quanto abbondano di acuti e pellegrini concetti; dacchè non possono mai gl'ingegni di veloce apprensiva scordarsi, scrivendo, di parlare a se stessi, eziandio quando intendono d'intertenerli ad istruire la gioventù; dirò cosa

cosa certamente quanto per essi loro onorifica , altrettanto vera; perciocchè confermata ne viene dall' esperienza di tanti Giovani; i quali siccome privi della viva voce del Maestro, non potendo nè dall' Opere de' valent' Uomini, e molto meno da' Compendj far chiara idea de' sottili artifizj dell' Algebra; abbandonano quindi una Scienza, alla Civil Società cotanto utile e necessaria. Per la qual cosa essendo io bastevolmente informato dall' esperienza di me medesimo di quel che richiedano ne' Libri d' Istituzioni que' Giovani principianti, i quali da puro natural genio guidati s' inoltrano senza scorta veruna nell' arduo cammino dell' analitiche speculazioni, ho io qui tentato in questa dilettevole e importantissima pratica della *Costruzione dell' Equazioni indeterminate &c.* di spianare ad essi la via, togliendo loro davanti ogni dubbio e oscurità, senza però unquemaï perdergli di vista nè punto abbandonargli; sicchè possano venire a termine felicemente del loro corso. E tantopiù volentieri fra tutte l'altre ho scelto a dichiarare questa materia; sì perchè troppo chiaro si vede, essere appunto questa quel primo scoglio che si attraversa agli studiosi d' Analisi, onde poi perdono ogni coraggio di proseguire; sì perchè ben compresa questa prova sensibile, ossia quest' ultimo ingegnoso sperimento della Verità ritrovata, pare che l' Algebra, anche la più austera e sublime, si renda nel progresso a' Giovani assai più dimestica e piana. Ora siccome il

poco ordine, la scarfezza degli efempj, la ofcura brevità dell' efpreffioni, e la varietà delle regole fono appunto quegli oftacoli che impediscono ondè non fi aggiunga perfettamente la cognizione di una qualunque Verità, e per confequente non fe ne ritenga la pratica; così ho io procurato di efendere, ampliare, ed ordinare, quanto il meglio per me fi è potuto chiaramente la materia; nè tanto ho riguardato alla femplicità e concinnità della figura, quanto fono ftato follecito di ferbare in ogni diverfo cafo l'uniformità delle fteffe regole, non variandole in varj cafi de' diverfi afpetti dell' Equazioni. Quindi, perchè lo Studiofo di Matematica, fe non in tutto, non averfe però molto a dipartirfi, anche in leggendo, quefto mio Libro, dalle Opere celebratiffime del Marchefe dell' *Opital*, e di Madama *Agnèfi*; poichè non abbiamo per mio avvio chi meglio di quefti due feliciffimi Ingegneri abbia faputo ordinare, e infieme facilitare l'Analifi; ho voluto perciò pigliare dall' *Opital* l'uniformità costante della pratica con la fua maniera chiariffima di efeguir la; applicandola poſcia, e come inneftandola all' ingegnerofa Metodo delle *Sofituzioni* ufato dall' *Agnèfi*: dacchè fe il Metodo delle *Comparazioni*, di che fi ferve l' *Opital*, fa forse troppo di materiale, e alla memoria è affai difficile il confervarfelo per le occorrenze; d'altra parte nella pratica dall' *Agnèfi* adoperata, fe giufto motivo fi ha certamente di ammirare l'ingegno di queſta incompa-

rabil

rabil Donna, inveggendola sì felicemente a procedere per varie strade allo stesso termine; non potrebbe però forse negarsi, che la ancor rude Gioventù, perdendo non rade volte il coraggio di seguirla, non la desidera per sé, anzi che più sottile ed ingegnosa, più facile e chiara. Ognuno vede pertanto, che io non ho già preteso nell' estendere questo Trattato, di recare nuovi metodi, ma piuttosto di proporre e di rischiarare con nuova maniera le antiche dottrine: il che suole unicamente desiderarsi da' Giovani principianti; a' quali ora indirizzando io questa primizia de' miei studj, spero che me ne sapranno buon grado; perciocchè vedranno per esperienza, che bene apprese le poche regole da me esposte, potranno agevolmente arrischiarsi in breve tempo a costruire di per se stessi qualunque più complicata Equazione, che loro venisse proposta. Nè io finalmente posso temere, che il Pubblico più sensato e discreto, il quale soltanto io venero e risguardo, venga a riprendermi, come rischiarato avendo quì ogni più minuta cosa, abbia io così fomentata in certa guisa la natural pigrizia degl'ingegni: poichè dal mio già sopra esposto intendimento, chiunque saprà ben rilevare, che ho io mirato unicamente a' Giovani di mediocre capacità e senza guida di Maestro; intorno a' quali, non già perchè impigriscano, ma perchè non disperino, mi pare che possa riputarli

tarfi commendabilissima la cura , di facilitar loro , quanto si può, questo studio; siccome quelli che non sono poi di così scarso numero, e che per esperienza si vede, che i più attenti sono, i più laboriosi, e i più atti per le pratiche operazioni; donde appunto deriva la grandissima utilità, che ne apportano le Matematiche.



ALLO



ALLO STUDIO
DI MATEMATICA
DIONIGIO RAMANZINI.

SE sogliono pressochè tutti gli Stampatori di qualche Opera dar contezza al Pubblico della diligenza adoperata nelle loro Stampe, lo si dee fare massimamente nelle materie Analitiche, di cui gli errori, siccome sono i più facili da commettersi, così riescono i più difficili da scuoprirsi da' Principianti, attesa l'aridità della Scienza che trattasi, e la riflessione matura che vi si richiede. Io non pertanto, Lettor benigno, dopo la fortuna avuta di pubblicare in tal genere altre rinomatissime, ed a miei Torchj onorevolissime Opere, spero di aver proceduto con piede sicuro anche nell'Edizione di questo, picciolo sì, ma come fu chiamato per uno de' più celebri e intelligenti P. Professori che vivano, il P. Let. COLOMBO, *Trattato bello, chiaro, e dotto*; onde non venga meno all' Autore la lode, che dee ritrarne: e tu mi debba sapere buon grado del leggerlo per mia industria in una, per quanto si è potuto, nitida e corretta Edizione. Basta solo avvertire, che le *parentesi* sì grandi e sì picciole si sono adoperate indifferentemente; dovendosi sempre intendere compresa tutta la frazione, quando venga racchiusa dalla *parentesi* la linea, che divide il numeratore dal denominatore. Vivi felice.

NOI

N O I

R I F O R M A T O R I

DELLO STUDIO DI PADOVA.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del *P. F. Serafino Maria Maccariuelli* Inquisitor General del Santo Officio di *Verona* nel Libro intitolato *Modo facile e chiaro per costruire l'Equazioni tutte indeterminate del secondo grado. de' luoghi alle Sezioni Coniche di Melchiorre Griffi di Lendinara* ms. non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica; e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi concediamo Licenza a *Dionisio Ramanzini* Stampator di *Verona*, che possi esser stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova..

Dat. li 23. Settembre 1759.

(f. Alvise Mocenigo 4^o. Kav. Proc. Riform.
(Marco Foscarini Kav. Proc. Riform.
(Francesco Morosini 2^o. Kav. Proc. Riform.

Registrato in. Libro a Carte 22. al Num. 128.

Gio. Girolamo Zuccato Segretario.

DE.



DEFINIZIONI.

1. **P**er il termine di Sezione Conica s'intende qualunque delle quattro linee curve, Circolo, Parabola, Ellissi, Iperbola, o Iperbole opposte.

2. Luogo geometrico è una linea, col mezzo della quale si costruiscono i problemi indeterminati: ed in particolare, se la linea retta sodisfa per la costruzione, il luogo si dice alla Linea retta, così pure si dirà luogo al Circolo, se di questo dovrà servirsi; e così parlando rispetto ad altre Curve.

3. Il Circolo è una linea curva, la essenziale proprietà della quale si è, che una qualunque Ordinata sia media proporzionale fra i segmenti del Diametro; e conseguentemente il di lei quadrato è uguale al rettangolo degli stessi segmenti. Se adunque nel Circolo A E D M si farà il raggio $AC = a$, e dal centro una qualunque Assissa $CB = x$, e l'Ordinata $BE = y$, sarà $AB = a + x$, $BD = a - x$, e però $AB \cdot BD = aa - xx$: quindi sarà $yy = aa - xx$, Equazione semplicissima al Circolo rispetto al quadrante S E D: Che se si prenda l'Ordinata, o l'Assissa negativa, ovvero tutte due, sempre

A

pre

TAV. I.
Fig. 1.

2 COSTRUZIONE DELL'EQUAZIONI

pre si verificherà la medesima Equazione; e però essa compete a tutto il Circolo.

TAV. I.
Fig. 2.

4. Nella Parabola Apolloniana abbiamo per sua primaria proprietà, che il quadrato di una qualunque Ordinata è uguale al rettangolo del Parametro nell'Assissa sull'Asse, se l'angolo delle Coordinate è retto, o sul Diametro, se l'angolo è obliquo. Chiamato adunque il Parametro $= a$, una qualunque Assissa $AB = x$, la corrispondente Ordinata $BC = y$, positiva, e negativa $BD = -y$; sarà in tutti e due i casi $yy = ax$. E qui si avverta, che non si può prendere l'Assissa negativa, perchè in tal caso la Equazione sarebbe $yy = -ax$, ovvero $ax = -yy$, e perciò la Curva immaginaria. Che se poi (Fig. 2.) sulla stessa AB dal punto A si volessero le y , e le Ordinate BC fossero $= x$, $BD = -x$; sarà la Equazione $xx = ay$; nella quale si possono prendere le x positive, e negative, ma solo positive le y , per la ragione or ora addotta.

TAV. I.
Fig. 3.

5. Una delle principali proprietà dell'Ellissi è, che il rettangolo de' segmenti del Diametro, sia al quadrato della corrispondente Ordinata; come il quadrato dell'Asse o Diametro trasverso, al quadrato dell'Asse o Diametro conjugato. Nella Ellissi adunque $AD EF$, chiamato il Diametro trasverso $= 2a$, il conjugato $= 2c$; presa dal centro una qualunque Assissa $BC = x$, la corrispondente Ordinata $BD = y$, farà l'analogia $aa - xx : yy = 4aa : 4cc$; e perciò l'Equazione $aa - xx = \frac{aa yy}{cc}$; la quale sempre si verifica, prendendo anche l' Ordinata, o l'Assissa negativa, oppure tutte e due negative.

6. La

6. La Iperbola, o Iperbole opposte in due modi si considereranno: se vengono queste riferite agli Assi loro o Diametri, oppure se descritte siano fra gli Assintoti. E quanto al primo già è noto, che una di esse primaria proprietà è, che il rettangolo della somma nella differenza del Semiasse o Semidiametro trasverso, e della Assissa, al quadrato dell' Ordinata, sta come il quadrato dell' Asse o Diametro trasverso, al quadrato del conjugato. Nell' Iperbola dunque CAD, essendo l'Asse trasverso AG = 2a, il conjugato LM = 2c, NB = x, BD positiva = y, sarà xx — aa: yy = 4aa: 4cc, e perciò

l'Equazione $\frac{aa yy}{cc} = xx - aa$; se poi si chiami

NB = y, BD = x, farà yy — aa: xx = aa: cc; e per conseguenza l' Equazione yy — aa =

$\frac{aa xx}{cc}$, cioè $\frac{cc yy}{aa} = xx + cc$; e risolvendo que-

sta Equazione in analogia, xx + cc: yy = cc:

aa, cioè $\overline{NE}^2 + \overline{NM}^2: \overline{ED}^2 = \overline{NM}^2: \overline{NG}^2$. E in questa curva ancora si può prendere la Ordinata, o l'Assissa negativa, ed anche tutte due negative. Se le Iperbole fossero equilateri, nel qual caso sarebbe 2a = 2c, avremmo l'Equazioni yy = xx — aa, e yy = xx + cc. Quanto alla Iperbola

fra gli Assintoti, il rettangolo di una qualunque AB presa sull'Assintoto bB nella BC Ordinata parallela all'Assintoto MN, o di Ab . bc, è sempre costante, cioè uguale ad un rettangolo dato; e però fatta AB = x, BC = y, e presa Ab negativa = —x, è c — y, sarà tanto AB . BC, quanto Ab . bc

$$A \quad 2 \quad =$$

TAV. I.
Fig. 4.

TAV. I.
Fig. 5.

$= xy$; e però la Equazione $xy = ab$. La Equazione poi $-xy = ab$ servirà per le opposte Iperbole negli angoli BAM , bAN .

C O R O L L A R I O .

7. **Q**Uindi è chiaro, che venendoci proposta da costruire una Equazione composta e complicata, per renderla facilmente costruibile, tutto l'artificio che devesi usare, consiste nell' introdurre opportune sostituzioni, onde maneggiata, e ridotta, ella ci si presenti in fine sotto l'aspetto delle semplici Equazioni, le quali abbiamo già veduto come si vengano a formare; del che parleremo ne' Problemi seguenti.

A V V E R T I M E N T O .

8. **N**On si è parlato punto di quelle Equazioni, le quali essendo all' Ellissi, e all' Iperbole opposte, per costruirle prender si vogliano le Affisse dai vertici di tali Curve; ciò per altro a bell' studio si è omeſſo, sì perchè così fatte Equazioni maneggiate che sieno, ci portano all' Equazione finale, che veste la forma di quelle già esaminate, sì perchè ognuno da se con molta facilità se le potrà formare, e quindi farvi quelle considerazioni, che opportunamente noi pure faremo su quelle che abbiamo già esposto. Parimente si è ristretto il discorso alla sola proprietà delle sopraccennate Curve, che compete a i loro Assi, o Diametri; perchè il metodo di costruire l' Equazioni più composte riesce per tal
via

via più semplice, che servendosi del Diametro, e Parametro corrispondente, come chiaramente in appresso si farà vedere.

C A P O P R I M O

Dell'Equazioni alla Parabola.

9. **P**ER discernere a prima vista, proposta che ci venga una Equazione, s'ella sia alla Parabola, due casi fa d'uopo distinguere: l'uno è, quando non c'entra il rettangolo delle Coordinate tra loro, cioè xy ; l'altro, quando vi si trova. Nel primo caso adunque, perchè il luogo sia alla Parabola, vi deve essere un quadrato solo delle incognite col segno positivo, ed al più il rettangolo delle costanti in una o l'altra, o anche di tutte due le incognite nelle stesse costanti; come per esempio $yy + ay - 2cx + aa = 0$; nel secondo vi debbono essere tutti due i quadrati delle incognite col segno positivo, ma però il quadrato della metà del coefficiente, che moltiplica il piano xy , deve essere uguale al coefficiente del quadrato di quell'incognita, secondo cui non è ordinata la Equazione, e negli altri termini li rettangoli di una, o di tutte due le incognite nelle costanti, come se fosse $yy + \frac{2bxy}{a} + \frac{bbxx}{aa} - cx = 0$.

PRO-

P R O B L E M A I.

10. **A** Bbiati a costruire la Equazione $yy - ax \rightarrow cc = 0$, cioè $yy = ax + cc$; la sostituzione da farsi è di $x + \frac{cc}{a} = u$. La regola è, premessa la trasposizione de' termini, di fare uguale a una nuova incognita l'indeterminata x + tutto il termine costante, secondo che questo ha il segno $\pm$, diviso per il coefficiente della detta indeterminata x ; fatta dunque la su accennata sostituzione, sarà $yy = au$: ed ecco ridotta la Equazione alla semplicissima specie, come al num. 4. Al vertice A, Diametro AC, col Parametro $= a$, si descriva la Parabola ADE, in essa saranno le AC le u , e le CD, CE le y , una positiva, e l'altra negativa; e perchè per la sostituzione fatta abbiamo $x = u - \frac{cc}{a}$; presa dal vertice A $B = \frac{cc}{a}$, sarà $BC = x$; nel punto B sarà l'origine delle x , verso C positive, e verso A negative; perchè essendo $AB = \frac{cc}{a}$, ed $AC = u$, sarà $BC = \frac{cc}{a} - u = -x$. Ora volendosi accertare, se il metodo è giusto, basta istituire l'Equazione sul fondamento della proprietà della Curva; e trovandosi la Equazione già prima proposta, sarà indizio, che il tutto starà ben fatto; il che a motivo di chiarezza si farà ad ogni Problema. Nel caso adunque presente, deve essere, $a \cdot AC = DC^2$; ma $AC = x + \frac{cc}{a}$, $CD = y$; dun-

TAV. I.
Fig. 6.

dunque $ax + cc = yy$, cioè $yy - ax - cc = 0$: il che &c.

P R O B L E M A II.

II. **S**ia da costruirsi la Equazione $yy - ay - ax + ab = 0$, ch'è la stessa, che $yy - ay = ax - ab$: si compisca il quadrato nel primo membro, sarà $yy - ay + \frac{aa}{4} = ax + \frac{aa}{4} - ab$: e facendo le due sostituzioni, una di $y - \frac{a}{2} = z$, l'altra di $x + \frac{a}{4} - b = u$, (num. 10.) sarà $zz = au$, Equazione alla Parabola (num. 4.). Qui si avverta, che la quantità $\frac{a}{4} - b$ può essere uguale, maggiore, o minore dello zero, secondo che $\frac{a}{4}$ è uguale, maggiore, o minore di b . Sia dunque il primo caso; non vi sarà bisogno della seconda sostituzione, dacchè sarà $zz = ax$. Al vertice A, Diametro AB, col Parametro $= a$, si descriva la Parabola ACD; saranno le AB le x , le BC le z positive, e le BD le z negative: fatta dunque FG parallela alle Ordinate $= \frac{a}{2}$, e condotta EH pure parallela al Diametro AB, nel punto E verso H sarà l'origine delle x positive, che a causa degli'immaginarj non si potranno prendere negative; e ad esse tra i punti E, F, corrisponderanno due Ordinate positive, nel punto F un' Ordinata sola positiva, ed oltre il punto F una positiva, ed una nega-

TAV. I.
Fig. 7.

negativa. Ora quì dove essere, $a : AB = \overline{BC}^2$; ma $AB = x$, $BC = y - \frac{a}{2}$; dunque $yy - ay + \frac{a^2}{4} = ax$: ma poichè $\frac{a}{4} - b = 0$, farà $\frac{a^2}{4} - ab = 0$, avremo ancora $yy - ay + \frac{a^2}{4} = ax + \frac{a^2}{4} - ab$, cioè $yy - ay - ax + ab = 0$: Nel secondo caso, quando cioè $\frac{a}{4} - b > 0$, si faccia $\frac{a}{4} - b = m$, la seconda sostituzione farà di $x + m = u$, e però $zz = au$. Al vertice A, Diametro AD, Parametro $= a$, si descriva la Parabola AML, faranno in essa le AD le u , le MD le z positive, e le DL le z negative: fatta pertanto $AC = m = \frac{a}{4} - b$, e condotta AE parallela alle Ordinate $-\frac{a}{2}$, e tirata EH pure parallela al Diametro, nel punto G verso H farà l'origine delle x positive, e verso il punto E delle negative; alle quali Assisse positive fra i punti F, H corrisponderanno due Ordinate, una positiva cioè la superiore, l'altra negativa, ch'è l'inferiore; nel punto F un'Ordinata sola positiva, e tra i punti F, E, tutte due positive. Quì ancora per proprietà della Curva si ha, $a : AD = \overline{DM}^2$; ma $AD = u = x + m = x + \frac{a}{4} - b$, $DM = y - \frac{a}{2}$; dunque $yy - ay + \frac{a^2}{4} = ax + \frac{a^2}{4} - ab$, cioè $yy - ay - ax + ab = 0$. Sia in terzo luogo $\frac{a}{4} - b < 0 = -m$,
la

TAV. I.
Fig. 8.

la seconda sostituzione farà di $x - m = u$, e però $xx = au$. Al vertice A, Diametro AE, col Parametro $= a$, si descriva la Parabola AGH, in diretto si aggiunga ad AE, la $AM = m$, farà $ME = u + m = x$; condotta poi MN parallela alle Ordinate della Parabola, facendola $= \frac{a}{2}$, e tirata NF parallela al Diametro, nel punto N verso F sarà l'origine delle x solo positive, nè si potranno avere le negative a cagione degl'immaginarj; alle quali fra i punti O, D corrisponderanno due Ordinate positive, nel punto D una sola positiva, ed oltre il punto D un'Ordinata positiva, ed una negativa: ed in fatti parlando del primo, infra i punti O, D abbiamo EG superiore $= z$; ma $FE = \frac{a}{2}$; dunque $FG = z + \frac{a}{2} = y$, così pure $HE = -z$; ma $FE = \frac{a}{2}$; dunque $FH = \frac{a}{2} + z = y$: nel punto D si ha $DC = z + \frac{a}{2} = y$,

ed oltre il detto punto, $EG = z$; ma $FE = \frac{a}{2}$; dunque $FG = z + \frac{a}{2} = y$, $FH = -z - \frac{a}{2} = -y$: il che &c. Per proprietà della Curva abbiamo $a \cdot AE = \overline{EG}^2$; ma $AE = u = x - m = x + \frac{a}{4} - b$, $EG = y - \frac{a}{2}$; dunque $ax + \frac{a^2}{4} - ab = yy - ay + \frac{a^2}{4}$, che è la stessa di $yy - ay - ax + ab = 0$.

il che &c.

B

PRO-

P R O B L E M A III.

12. Sia da costruirsi la Equazione $yy - ay + ax - aa = 0$, oppure $yy - ay = aa - ax$; si compisca il quadrato nel primo membro dell'Equazione, sarà $yy - ay + \frac{a^2}{4} = \frac{5a^2}{4} - ax$; e fatta la sostituzione di $y - \frac{a}{2} = z$, indi (num. 10.) di $\frac{5a^2}{4} - x = u$, avremo $zz = au$, luogo alla Parabola. Al vertice A, Diametro AM, Parametro = a , si descriva la Parabola ADG, fatta $AM = \frac{5a}{4}$, e presa $AO = u$, sarà $MO = \frac{5a}{4} - u = x$; faccendosi poi $MN = \frac{a}{2}$, e tirata NP parallela al Diametro, nel punto N verso F sarà l'origine delle x positive: ma $DO = z$; dunque FD superiore = $z + \frac{a}{2} = y$, FD poi inferiore = $-z - \frac{a}{2} = -y$. Alle Asse pertanto positive corrisponderanno tra i punti N, C due Ordinate, positiva una, negativa l'altra; nel punto C una sola Ordinata positiva, essendo $CC = z + \frac{a}{2} = y$; ed oltre il punto C due Ordinate positive, essendo PE maggiore = $z + \frac{a}{2} = y$, PE minore = $\frac{a}{2} + z = y$, per essere SE inferiore = $-z$. Per proprietà della Curva abbiamo $a \cdot AO = LO$; ma $AO = \frac{5a}{4} - x$, $DO = y$

TAV. 1.
Fig. 10.

$= y - \frac{a}{2} = -y + \frac{a}{2}$; e però $\frac{5a^2}{4} - ax = yy$
 $= ay + \frac{a^2}{4}$, cioè $yy - ay + ax - aa = 0$;
 il che &c.

P R O B L E M A IV.

13. **D**Ebbasi costruire la Equazione $xx - ay$
 $+ aa = 0$, oppure $xx = ay - aa$;
 facciassi la sostituzione (num. 10.) di $y - a = u$,
 ed avremo $xx = au$. Col Diametro AB, Parametro $= a$, si descriva la Parabola ADC, saranno TAV. II.
Fig. 11.
 in essa le AB le u , e le BC, BD le x , una positiva,
 l'altra negativa: ma per la sostituzione fatta ab-
 biamo $y = u + a$; dunque fatta AE $= a$, e tira-
 ta EF parallela alle Ordinate della Parabola, indi
 FC parallela pure ad EB, farà EF $= x$, FC $= y$.
 Nel punto adunque E verso F sarà l'origine delle x
 positive, e verso M negative, alle quali x , sì positive,
 come negative, corrisponderà sempre un'Ordinata so-
 lo positiva, e ciò a cagione dell'immaginarj. Ora de-
 ve essere per proprietà della Curva $a \cdot AB = \overline{BC}^2$: ma
 $AB = y - a$, $BC = x$; dunque $ay - aa = xx$,
 cioè $xx - ay + aa = 0$.

P R O B L E M A V.

TAV. II.
Fig. 12.

14. **A** Bbiassi da costruire la Equazione $xx - 2ax + ay - aa = 0$, cioè $xx - 2ax = aa - ay$; si compisca il quadrato nel primo membro della Equazione, avremo $xx - 2ax + aa = 2aa - ay$; si facciano le due sostituzioni, una di $x - a = z$, l'altra (num. 10.) di $2a - y = u$; e sarà $zz = au$. Al vertice A, Parametro $= a$, Diametro AB, si descriva la Parabola ACD; fatta in essa AB $= 2a$, e presa AG $= u$, sarà BG $= 2a - u = y$ positiva: si prenda EB $= a$, e si conduca EF parallela ad AB, e FG parallela pure a CD, sarà BG $= FE = y$, BD $= z$: ma EB $= a$; adunque ED $= z + a = x$ positiva: nel punto E verso D sarà dunque l'origine delle x positive, e verso C negative; poichè BC $= -z$, e CE $= -z - a = -x$ negativa; alle quali x sì positive, come negative, prese dentro la Curva, corrisponderà solo un' Ordinata positiva: prese poi fuori della Curva sì positive, sì negative corrisponderanno ad esse due altre Ordinate y negative, che vanno alla convessità della Curva. Proprietà è della stessa Curva, che $a \cdot AG = GH^2$; ma AB $= 2a$, BG $= y$, dunque AG $= 2a - y$, GH $= x - a$; sarà perciò $2aa - ay = xx - 2ax + aa$, cioè $xx - 2ax + ay - aa = 0$; il che &c.

P R O-

PROBLEMA VI.

15. **D**Ata da costruire la Equazione $yy - \frac{2bxy}{a} + \frac{bbxx}{aa} - bx + cc = 0$, cioè
 $yy - \frac{2bxy}{a} + \frac{bbxx}{aa} = bx - cc$, si faccia $y - \frac{bx}{a} = z$, e $x - \frac{cc}{b} = u$ (num. 10.); sarà $zz =$

bu . Sulla retta indefinita AE, si descriva il trian-^{TAV. II.}
 golo ABC coi lati $AB = a$, $BC = b$, cioè il ^{Fig. 13.}
 primo lato $AB =$ al denominatore della frazione,
 che moltiplica l'incognita x nella prima sostituzione
 fatta di $y - \frac{bx}{a} = z$, il secondo $=$ al numerato-

re di essa frazione; e poichè l'angolo delle Coordi-
 nate quì si suppone dato, il quale, come si vedrà,
 viene ad essere $= ABC$, sarà pure per la Trigo-
 nometrìa in esso triangolo noto il terzo lato AC ,
 che si chiami $= f$. Si producano pure indefinita-
 mente le rette AB , AC , e si compisca il trian-
 golo ADE, facendosi già DE parallela a BC;
 sarà per la similitudine de' triangoli ABC, ADE,
 presa $AD = x$, $DE = \frac{bx}{a}$. Sulla AD si prenda

$AF = \frac{cc}{b}$, sarà $FD = x - \frac{cc}{b} = u$; e condotte
 FG, HG, l'una parallela a BC, l'altra a FD;
 sarà per la similitudine de' triangoli ABC, GHE,
 $GE = \frac{fx}{a} - \frac{ccf}{ab}$. Ora al vertice G, Diametro
 GE,

GE, Parametro $= \frac{a b}{f}$; (il quale in queste Equazioni prender si dee sempre per regola generale $=$ alla quarta proporzionale della nota linea AC nel triangolo ABC, del denominatore della frazione che moltiplica quella incognita, per la quale non viene ordinata la Equazione nella prima sostituzione fatta, e del Parametro dell'Equazione ridotta, cioè di $f : a = b : \frac{a b}{f}$) sarà la superiore DM $= z$ positiva, e la inferiore $= -z$ negativa: imperocchè EM $= z$, stante la Equazione finale: ma DE $= \frac{b x}{a}$; dunque DM $= z + \frac{b x}{a} = y$ nel primo caso; EM $= -z$, parlando del secondo: ma è pure DE $= \frac{b x}{a}$; dunque

DM $= -z - \frac{b x}{a} = -y$. Prendendosi adunque le $x >$

A O, corrisponderanno ad esse due Ordinate una positiva, l'altra negativa; facendole $=$ A O, lor corrisponderà nel Punto O un'Ordinata sola positiva; e prendendole tra i punti F, O, corrisponderanno ad esse due Ordinate, tutte e due positive. Per proprietà della Curva abbiamo

$\frac{a b}{f} \cdot GE = ME^2$: ma GE $= \frac{f x}{a} -$

$\frac{c c f}{a b}$, $ME = (y - \frac{b x}{a})$; dunque $\frac{a b}{f} \cdot (\frac{f x}{a} - \frac{c c f}{a b}) = y y$

$- \frac{2 b x y}{c} + \frac{b b x x}{a a}$, cioè $y y - \frac{2 b x y}{a} + \frac{b b x x}{a a} - b x + c c = 0$: il che &c.

P R O-

P R O B L E M A VII.

16. **D**Ebbasi costruire la Equazione $yy + xy + \frac{x^2}{4} - 2by - bb = 0$, cioè $yy + xy + \frac{x^2}{4} = 2by + bb$: si faccia la sostituzione di $y + \frac{x}{2} = z$, avremo $zz = 2bz + bb$: nel presente caso, in cui c'è il rettangolo delle costanti nell'incognita, secondo la quale è ordinata la Equazione, bisogna fare sparire detta incognita, e in luogo di lei adoprare quel suo valore, che si cava dalla prima sostituzione fatta; come qui essendoci il termine $+ 2by$, e cavandosi dalla prima sostituzione $y = z - \frac{x}{2}$, si sostituisca un tal valore in luogo di y nell'Equazione $zz = 2bz + bb$, e farà $zz = 2bz - bx + bb$, cioè $zz - 2bz = bb - bx$: si compisca ora il quadrato nel primo membro, ed avremo $zz - 2bz + bb = 2bb - bx$; e fatte le due sostituzioni, una di $z - b = u$, l'altra (num. 10.) di $2b - x = q$, farà $uu = bq$. Sulla retta AC si descriva il triangolo ABC, coi lati $AB = 2$, $BC = 1$, e si chiami la nota $AC = f$, sulla AB si prenda $AP = x$, e AE $= 2b$, farà (tirate PM, e FE parallela a BC) PM $= \frac{x}{2}$; e condotta ancora MD parallela a PE, farà $MF = bf - \frac{fx}{2}$, essendo $PE = 2b - x$, e simili i triangoli ABC, MDF. Ora poichè si è fatta la seconda

TAV. II.
Fig. 14.

16 COSTRUZIONE DELL'EQUAZIONI

con la sostituzione di $z - b = u$, vedendo che la z appartiene alla indeterminata y , si alzi $AN = b$, perchè nell' accennata sostituzione si ha il termine $-b$; e si dovrebbe abbassare, se il detto termine fosse positivo; e condotta NO parallela ad AF , al vertice O , Parametro $= \frac{2b}{f}$ (num. 15.) Diametro NO

si descriva la Parabola KOK , farà in essa, attesa la Equazione finale, HK superiore $= u$, HK inferiore $= -u$; ma $HM = b$; dunque MK superiore $= u + b = z$; ma $PM = \frac{x}{2}$; dunque $PK = z$

$-\frac{x}{2} = y$ positiva; ma MK inferiore $= -u - b$
 $= -z$, e $PM = \frac{x}{2}$, e però $PK = \frac{x}{2} - z = -$

y negativa. Alle x dunque negative, e positive prese minori di AQ , corrisponderanno due Ordinate y , una positiva, l'altra negativa; prese $= AQ$, si avrà nel punto Q un'Ordinata sola negativa; prese tra i punti Q , ed E , ne corrisponderanno due, ambe ne-

gative. La proprietà della Curva ci dà $\frac{2b}{f} \cdot (bf - \frac{fx}{2})$
 $= (y + \frac{x}{2} - b)^2$, cioè $2bb - bx = yy + xy +$
 $\frac{xx}{4} - 2by - bx + bb$, ch'è lo stesso che $yy + xy +$
 $\frac{xx}{4} - 2by - bb = 0$: il che &c.

Si avverta, che $AN = b$ deve essere parallela alle Ordinate della Parabola.

PRO-

P R O B L E M A VIII.

17. **S**ia la Equazione $xx - \frac{2bxy}{a} + \frac{bbyy}{a} - 2bx + aa = 0$; si faccia la sostituzione di $x - \frac{by}{a} = z$, sarà $zz = 2bx - aa$: e quì, poichè c'è il rettangolo delle costanti nella incognita, per la quale sta ordinata la Equazione, cioè $2bx$, si faccia sparire detta incognita, (num. 16.) e sarà $zz = 2bz + \frac{2bby}{a} - aa$; cioè $zz - 2bz + bb = \frac{2bby}{a} + bb - aa$; fatta la sostituzione di $z - b = u$, e per brevità $bb - aa = mm$, avremo $uu = \frac{2bby}{a} + mm$; e fatta parimente l'altra sostituzione di $y + \frac{amm}{2bb} = q$, (num. 10.) sarà $uu = \frac{2bbq}{a}$. Per trovare il Parametro, s'istituiscasi la proporzione, (num. 15.) della nota $f: a = \frac{2bb}{a} : \frac{2bb}{f} = \text{Parametro}$. Sulla retta AC a sinistra si descriva il triangolo ABC, per essere nell'Equazione prima il termine $\frac{2bxy}{a}$ negativo, e alla destra, se fosse positivo; e sia $AB = a$, $BC = b$, AC nota $= f$, e l'angolo $ABC =$ all'angolo delle Coordinate x, y ; si determini $AP = y$, e si tiri la parallela PS a BC, sarà $PS = \frac{by}{a}$, $AS = \frac{fy}{a}$; si prolunghi AP al di sotto, onde sia $AQ = \frac{amm}{2bb}$, essendosi già fatta la ultima
C soffi.

TAV. II.
Fig. 15.

sostituzione di $y + \frac{amm}{2bb} = q$, e compiuto il triangolo A Q E, facendosi EQ parallela a P S, sarà $AE = \frac{fmm}{2bb}$, e però $SE = AS + AE = \frac{fy}{a} + \frac{fmm}{2bb}$; si prenda EO = b a parte destra di EC, essendosi fatta la seconda sostituzione di $z - b = u$; e a parte sinistra della EC, se la sostituzione fosse stata di $z + b = u$. Al vertice O, Parametro trovato di $\frac{2bb}{f}$, Diametro OG parallelo a SE, si descriva la Parabola OM, prolungata EO, in F tenendola parallela a PM, e facendo pure FM parallela QP, sarà QF = PM = x; e conducendo perfino AH parallela a QF, sarà HM = AP = y. Per proprietà della Curva si ha $\frac{2bb}{f} \cdot OG = GM^2$: ma OG = SE = $\frac{fy}{a} + \frac{fmm}{2bb}$, GM = $x - \frac{by}{a} - b$; dunque

$$\frac{2bb}{f} \cdot \left(\frac{fy}{a} + \frac{fmm}{2bb} \right) = \left(x - \frac{by}{a} - b \right)^2, \text{ cioè } \frac{2bby}{a} + mm = xx - \frac{2bxy}{a} + \frac{bbby}{aa} - 2bx + \frac{2bby}{a} + bb;$$

ma $mm = bb - aa$, dunque $xx - \frac{2bxy}{a} + \frac{bbby}{aa} - 2bx + aa = 0$. Che sia GM = $x - \frac{by}{a} - b$ è chiaro; poichè, stante la Equazione finale, è GM = u; ma SG = b, onde SM = u

$= u + b = z$; ma in oltre $PS = \frac{by}{a}$, dunque $PM = z + \frac{by}{a} = x$, e però $GM = x - \frac{by}{a} - b$.

Che se fosse $bb - aa = -mm$, la Equazione $zz - 2bz + bb = \frac{2bby}{a} + bb - aa$, diventerà $zz - 2bz + bb = \frac{2bby}{a} - mm$; e fatte le due sostituzioni di $z - b = u$, e di $y - \frac{amm}{2bb} = q$, farà $uu = \frac{2bbq}{a}$. In tal caso, si prenda AQ a parte con-
TAV. II.
Fig. 16.

traria di prima $= \frac{amm}{2bb}$; e condotta RE parallela a QP , farà $SE = \frac{fy}{a} - \frac{fmm}{2bb}$; e fatta $EO = b$, e parallela a PS , il vertice della Parabola cadrà in O , ed intal caso $AH = x$, $HM = y$; e quì alle x sì positive, che negative corrisponderà sempre un'Ordinata positiva: ma nel primo caso, presa x tra
TAV. II.
Fig. 15.
i punti K, H corrisponderà un'Ordinata sola positiva; e presa $= AK$, corrisponderà solo un'Ordinata $= 0$; e presa $< AK$, ne corrisponderà pure una sola negativa: lo stesso si osservi prendendo le x negative.

P R O B L E M A IX.

18. SIA l'Equazione $xx + \frac{2bxy}{a} + \frac{bbyy}{aa} - bx = 0$, o sia $xx + \frac{2bxy}{a} + \frac{bbyy}{aa} = bx$; si faccia $x + \frac{by}{a} = z$, farà $zz = bx$; e facendo sparire la incognita x , secondo cui è ordinata l'Equazione, sostituendo il di lei valore (num. 16.) di $x = z - \frac{by}{a}$, avremo $zz = bz - \frac{bb y}{a}$, cioè $zz - bz + \frac{bb}{4} = \frac{bb}{4} - \frac{bb y}{a}$; e fatte le due sostituzioni una di $z - \frac{b}{2} = u$, e l'altra di $\frac{a}{4} - y = p$ (num. 10.), farà finalmente $uu = \frac{bbp}{a}$. Sulla retta AS a destra, per essere il termine $\frac{2bxy}{a}$ nell'Equazione positivo, si descriva il triangolo ABC coi lati $AB = a$, $BC = b$, e si chiami al solito la nota $AC = f$, e sia l'angolo ABC = al complemento a due retti dell'angolo delle Coordinate x, y ; si determini $AQ = y$, farà QF, che sia parallela a BC, $= \frac{by}{a}$, e AF $= \frac{fy}{a}$; si faccia $AH = \frac{a}{4}$ stante l'ultima sostituzione di $\frac{a}{4} - y = p$, quindi $QH = \frac{a}{4} - y = p = FV$, tirata prima FV parallela alla stessa QH; onde per i tri-

TAV. II.
Fig. 17.

i triangoli simili ABC , SFV , sarà $SF = \frac{f}{4} - \frac{fy}{a} = \frac{fp}{a}$; fatta in oltre $AD = \frac{b}{2}$, presa a destra di AS , e parallela a FQ , e condotte DC parallela ad AS , e SC pure parallela ad AD ; al vertice C , Parametro $= \frac{bb}{f}$ si descriva la Parabola

RCR , si prolunghi FQ fino alla concavità della Curva in M , presa una qualunque AP , e fatta PM parallela ad AQ , sarà essa $PM = y$, e la Parabola il luogo ricercato. Alle x però sì positive, che negative, non già prese fuori della Curva, corrisponderà sempre un'Ordinata positiva; prese poi fuori, ne corrisponderà una negativa, che andrà alla convessità della stessa Curva. Che $AP = x$, $PM = y$, è chiaro: perciocchè $PM = AQ$; ma AQ determinata $= y$, dunque $PM = y$: che $AP = x$, si fa vede-

re così: $GM = u$, $FG = AD = \frac{b}{2}$, perciò $FM = GM + FG = u + \frac{b}{2} = z$; ma $FQ = \frac{by}{a}$,

dunque $QM = AP = z - \frac{by}{a} = x$. La proprietà della Parabola ci dà $\frac{bb}{f}$. $CG = \overline{GM}^2$; ma $CG =$

$SF = \frac{f}{4} - \frac{fy}{a}$, $GM = x + \frac{by}{a} - \frac{b}{2}$; dunque $\frac{bb}{f}$.

$(\frac{f}{4} - \frac{fy}{a}) = (x + \frac{by}{a} - \frac{b}{2})^2$, cioè $\frac{bb}{4} - \frac{bby}{a} =$

xx

22 COSTRUZIONE DELL'EQUAZIONI

$xx + \frac{2bxy}{a} - bx + \frac{bbyy}{aa} - \frac{bby}{a} + \frac{bb}{4}$, ch'è lo
 stesso, che $xx + \frac{2bxy}{a} + \frac{bbyy}{aa} - bx = 0$: il che
 &c.

P R O B L E M A X.

TAV. II.
 Fig. 18.

19. *Data di posizione la retta indefinita AB con un punto F fuori di essa: Si cerca il luogo di tutti i punti M tali, da quali condotte le rette MP, MF, l'una perpendicolare ad AB, l'altra al dato punto F, sia sempre $MP = MF$; e perchè vi può essere un'infinità di tali punti, si cerca quale di essi ne possa essere il luogo.*

SI conduca AF parallela a MP, e MS pure parallela ad AP: chiamisi $AF = a$, $AP = x$, $MP = y$, sarà $FS = a - y$, quindi $MF = \sqrt{(xx + yy - 2ay + aa)}$, e però per la condizione del Problema avremo $y = \sqrt{(xx + yy - 2ay + aa)}$; e quadrando, $yy = xx + yy - 2ay + aa$, cioè $xx - 2ay + aa = 0$, luogo alla Parabola (num. 9.): trasportando, avremo $xx = 2ay - aa$; e facendo $y - \frac{a}{2} = u$ (num. 10.) sarà $xx = 2au$: Nella AS si pigli AO = $\frac{a}{2}$, e al vertice O, Parametro = $2a$, si descriva la Parabola OM; sarà essa il luogo ricercato. Imperocchè $SM = AP = x$, $OS = u$, stante l'Equa-

Equazione ridotta; ma $AO = \frac{a}{2}$, dunque $AS = MP = u + \frac{a}{2} = y$. La proprietà della Curva richiede che $\overline{SM}^2 = 2a \cdot SO$: ma $SM = AP = x$, $SO = y - \frac{a}{2}$; onde $xx = 2ay - aa$, cioè $xx - 2ay + aa = 0$.

C O R O L L A R I O.

20. **E'** chiaro, che il punto F è il fuoco della Parabola, essendo $FO = AO = \frac{a}{2} = \frac{2a}{4}$, cioè = alla quarta parte del Parametro, e di più $FM = MP$.



PRO-

P R O B L E M A X I.

TAV. II.
Fig. 19.

21. *Date di posizione due rette linee DN, DR indefinitamente prolungate sopra un piano, con un punto C fuori di esse: si concepisca, che un'angolo dato CRM si muova col suo vertice sulla linea DR, prima da B verso R, indi tra B, ed A cominciando da B, in maniera che il suo lato RC, che prolungato incontra DN in N, passi sempre per lo medesimo punto C, e che l'altro suo lato RM sia sempre terzo proporzionale a NC, CR. Si dimanda il luogo di tutti i punti M, che si andranno scorrendo con questo moto.*

SI muova primieramente il vertice R lungo la linea DR a parte destra del Punto B; si conducano CA parallela a DN, e CB, che faccia sopra DR al punto B l'angolo $CBR = CRM$, in modo che cadendo CR sopra CB, anche RM cada sopra BR. Si conduca AQ, che faccia l'angolo $QAB = CBA$, e si tiri per uno de' punti M una retta MP parallela ad AQ, e che incontri DR prolungata in P; saranno simili i triangoli CBR, PRM; imperocchè l'angolo esterno $CRP = CBR + BCR$ interni opposti; ma $CRM = CBR$ per la costruzione; dunque anco il restante $MRP = BCR$. In oltre $MPR + QAB =$ a due retti, attese le parallele AQ, MP; ma $QAB = CBA$ per la costruzione; dunque anco $MPR + CBA =$ a due retti; ma sono pure $CBR + CBA =$ a due retti; dunque, $MPR + CBA = CBR + CBA$; onde

onde $MPR = CBR$, quindi simili i triangoli MPR , CBR . Si chiamino pertanto $AD = a$, $AB = b$, $BC = c$, e le variabili $AP = x$, $PM = y$, $AR = z$. Sarà sì per causa delle parallele DN , AC , che per la condizione del problema $AD(a) : AR(z) = CN : CR = CR : RM = CB(c) : RP(x - z) = BR(z - b) : PM(y)$; e moltiplicando gli estremi, e medj, faranno le due equazioni $ax - az = cz$, e $ay = zz - bz$; e facendo sparire nella seconda la z , sostituendo il di lei valore dato per x , cavato dalla prima, che viene ad essere (ponendo per brevità $f = a + c$) $\frac{a^2 x}{f} = z$, si ridurrà la seconda Equazione a questa $xx - \frac{bfx}{a} - \frac{ff y}{a} = 0$, luogo alla Parabola (num. 9.) Sarà perciò $xx - \frac{bfx}{a} + \frac{b b f f}{4 a a}$ $= \frac{ff y}{a} + \frac{b b f f}{4 a a}$; e facendo le due sostituzioni, una $x - \frac{bf}{2a} = u$, l'altra di $y + \frac{bf}{4a} = q$ (num. 10.) verrà ad essere $uu = \frac{ff q}{a}$. Sulla linea AP , si prenda $AF = \frac{bf}{2a}$; e avendo condotta FL parallela a PM , si pigli in essa $FG = \frac{b b}{4 a}$; al vertice G ; Diametro GL , Parametro $= \frac{ff}{a}$, si descriva la Parabola GOM , che abbia per Ordinate alcuna delle rette LM parallela ad AP , la di lei porzio-

D

ne

ne OM farà il luogo ricercato. Imperocchè proprietà è della Curva che $\frac{ff}{a} \cdot GL = \overline{LM}^2$; ma $GL = y + \frac{bb}{4a}$, $LM = x - \frac{bf}{2a}$; dunque $\frac{ff}{a} \cdot (y + \frac{bb}{4a}) = (x - \frac{bf}{2a})^2$, cioè $xx - \frac{bfx}{a} - \frac{ffy}{a} = 0$: il che &c.

Si muova il vertice R tra B, ed A cominciando da B, e sia giunto in E; in tal caso è chiaro, che la linea EM cadrà giù della AR; e cada in M: si tiri PM parallela ad AQ, faranno istessamente simili i due triangoli EPM, ECB; imperocchè l'angolo esterno CBR = BEC + ECB interni opposti; ma per la costruzione, CEM = CBR; dunque CEM = BEC + ECB; e tolto di comune BEC, sarà PEM = ECB: ma in oltre EPM = QAB alterno = CBA per la costruzione; e però simili i due triangoli CEB, EPM; quindi avremo come prima AD (a): AE (z) = NC: CE = CE: EM = CB (c): EP (x - z) = BE (b - z): PM (-y) la quale PM = -y, perchè è tirata a parte opposta della prima; e però faranno le due Equazioni $ax - az = cz$; $zx - bz = ay$; dalle quali, come nel primo caso (fatta già $f = a + c$) se ne cava $xx - \frac{bfx}{a} - \frac{ffy}{a} = 0$, Equazione pure alla Parabola, che maneggiata nel medesimo modo della prima, e colle stesse sostituzioni, si riduce a questa $uu = \frac{ffq}{a}$.
Si

Si descriva come nel primo caso la stessa Parabola A G O M col Parametro $= \frac{ff}{a}$, si prenda pure

$FG = \frac{bb}{4a}$, e la Ordinata L M si tiri al di sotto di A R, farà $GL = GF - FL = GF - PM$, cioè $= \frac{bb}{4a} + y$, ed $LM = x - \frac{bf}{2a}$, e però si troverà la stessa Equazione; quindi la porzione A G O della Parabola A G O M farà in questo caso il luogo di tutti i punti M ricercati.

C A P O. S E C O N D O

Dell' Equazioni all' Ellissi.

21. **L'** Equazione semplicissima all' Ellissi viene espressa in questa forma $aa - xx = \frac{aayy}{cc}$ (num. 5.) ; dove presto si vede che la radice quadrata del termine costante, cioè $a =$ al Semiasse, o Semidiametro trasverso; e se la frazione, che moltiplica il quadrato dell' Ordinata è tale, che il di lei numeratore sia $=$ al termine costante diviso per una qualunque quantità data, la radice di tal denominatore farà sempre il Semidiametro conjugato: ma se l' Equazione non abbia questa condizione, per avere il Diametro conjugato bisogna fare, come il numeratore della frazione che moltiplica il quadrato dell' Ordinata, al suo denominatore; così il termine costante, al quarto; la di cui radice sarà uguale al Semidiametro conjugato: come per esempio nell'

D 2 Equa-

Equazione $ab - xx = \frac{ccyy}{aa}$, Vab è = al Semidiametro trasverso: ma per avere il conjugato, si faccia $cc : aa = ab : \frac{a'b}{cc}$; quindi sarà $\frac{a}{c} Vab$ = al Semidiametro conjugato: e che ciò sia vero, deve stare (parlando dell'Equazione $ab - xx = \frac{ccyy}{aa}$) $ab - xx : yy = ab : \frac{a'b}{cc} = \frac{cc}{aa} : 1$; quindi l'Equazione proposta $ab - xx = \frac{ccyy}{aa}$. Ciò pe-

rò si verifica in quelle Equazioni finali provenienti da quelle primarie, in che non c'entra il rettangolo delle incognite fra loro; le quali perchè siano all'Ellissi, è d'uopo che i due quadrati delle incognite abbiano tutti e due il segno positivo, e quello dell'Ordinata sia senza frazione, e negli altri termini vi sia al più il rettangolo di una, o di tutte due le incognite nelle costanti; come se l'Equazione primaria fosse $yy - 2ay + \frac{ccxx}{bb} - ax + aa = 0$: ma

nell'altre Equazioni ridotte, che provengono da quelle primarie, dove c'entra il piano xy , le quali perchè siano all'Ellissi, bisogna che il quadrato dell'Ordinata yy sia libero da frazione, ed abbia insieme coll'altro quadrato xx il segno positivo; e oltre a ciò, che il quadrato della metà del coefficiente che moltiplica il piano xy , sia minore del coefficiente del quadrato xx , e negli altri termini i rettangoli delle costanti nelle incognite; come se fosse l'Equazione $yy - \frac{bxy}{a} + \frac{bbxx}{aa} - ay + cx = 0$; nell'Equa-

zio.

zioni pertanto finali prodotte da queste , la maniera sì per trovare il Diametro trasverso , che il conjugato è diversa; e per maggiore chiarezza se ne parlerà nel caso de' Problemi , che si andranno proponendo .

C O R O L L A R I O .

23. **D**All' Equazioni all' Ellissi nascono quelle al Circolo: e ciò avviene (parlando di quelle Equazioni in che da prima non c'entra il piano xy) quando i quadrati delle incognite sono tutti due liberi da frazione, e l'angolo che fanno tra esse è retto; come se fosse $yy - 2cy + xx - bx + aa = 0$: il che anche ci mostra evidentemente la stessa Equazione all' Ellissi $aa - xx = \frac{aayy}{cc}$, perchè in tal caso il Diametro trasverso è uguale al conjugato, cioè $2a = 2c$; e però l' Equazione si muterà in questa $aa - xx = yy$, ch'è al Circolo (num. 3.): ma nell' altre Equazioni , è d' uopo che non solo i due quadrati dell' incognite sieno liberi da frazione, e col segno positivo; ma di più, che l' angolo dell' Ordinate al Diametro sia retto; come il tutto s' intenderà meglio da' Problemi.



PRO-

P R O B L E M A I.

24. SIA da costruirsi l'Equazione $yy - 2ay + \frac{aaxx}{cc} - bb = 0$, cioè $yy - 2ay =$

$bb - \frac{aaxx}{cc}$: si compisca il quadrato nel primo membro, sarà $yy - 2ay + aa = aa + bb - \frac{aaxx}{cc}$; si faccia $y - a = z$, sarà $zz = aa +$

$bb - \frac{aaxx}{cc}$, ch'è lo stesso, che $\frac{cczz}{aa} = \frac{22}{aa} + \frac{22}{cc} - xx$: il Semidiametro trasverso è certo

$c \sqrt{\left(\frac{aa+bb}{a^2} \right)}$ (num. 22.): e per trovare il 'conjugato si faccia (numer. citato) $cc : aa = \frac{22}{cc} + \frac{22}{cc} : aa + bb$; quindi $2 \sqrt{aa + bb} =$

TAV. II.
Fig. 10.

al Diametro conjugato. Col Diametro dunque trasverso $AB = \frac{2c \sqrt{aa+bb}}{a}$, e conjugato $=$

$2 \sqrt{aa + bb}$, si descriva la Ellissi $AEBD$, sarà stante l'Equazione ridotta, $CF = x$, $FG = z$: si prolunghi al di sotto FG , e si prenda $FH = a$, conducendosi CM parallela alla stessa FH , sarà $HG = z + a = y$, $MH = CF = x$: avremo adunque nel punto M l'origine delle x positive verso H , e negative verso Q ; alle quali si positive $< MO$, come negative $< MP$

cor-

corrisponderanno sempre due Ordinate, una positiva, l'altra negativa: prese poi positive $> MO$, ma tra' punti O, S ; così pure prese negative $> PM$, ma tra i punti P, Q , loro corrisponderanno due Ordinate positive: prese poi finalmente $= MO$ essendo positive, e $= MP$ essendo negative, si avrà una sola Ordinata positiva. Per proprietà

della Curva abbiamo $\overline{CB} = \overline{CF} : \overline{FG} =$
 $\frac{4ac + 4bc}{aa} : 4aa + 4bb = 1 : \frac{aa}{cc}$; ma $\overline{CB}$
 $= \frac{aacc + bbcc}{aa}$; $\overline{CF} = xx$, $\overline{FG} = yy - 2ay$
 $+ aa$; sarà dunque $\frac{aacc + bbcc}{aa} = xx : yy -$
 $2ay + aa = 1 : \frac{aa}{cc}$, cioè $aa + bb = \frac{aaxx}{cc}$
 $= yy - 2ay + aa$, ch'è lo stesso, che $yy -$
 $2ay + \frac{aaxx}{cc} - bb = 0$: il che &c.



PRO-

P R O B L E M A II.

25. Sia l'Equazione $yy + by + \frac{bxx}{c} - ax = 0$; trasportando, ed aggiugnendo all'una, e all'altra parte $\frac{bb}{4}$, farà $yy + by + \frac{bb}{4} = ax - \frac{bxx}{c} + \frac{bb}{4}$: si faccia $y + \frac{b}{2} = z$, avremo $zz = ax - \frac{bxx}{c} + \frac{bb}{4}$, cioè $\frac{bc}{4} - \frac{axx}{b} = xx - \frac{acx}{b}$; e compiendo il quadrato nell' omogeneo di comparazione, farà $\frac{bc}{4} + \frac{aacc}{4bb} - \frac{czz}{b} = xx - \frac{acx}{b} + \frac{aacc}{4bb}$; e facendo $x - \frac{ac}{2b} = u$, si avrà finalmente $\frac{bc + aacc}{4bb} - uu = \frac{czz}{b}$; $\frac{V(bc + aacc)}{2b}$ = al Semidiametro trasverso; il conjugato intero

TAV. III.
Fig. 24.

= $V(\frac{b^3 + aac}{b})$ (num. 22.) - Col centro A ;

Diametro trasverso = $\frac{V(bc + aacc)}{b} = CB$, e

Conjugato = $V(\frac{b^3 + aac}{b})$, si descriva la Ellisse C E B D ; si tiri la Ordinata G F , farà $cf = z$, A G = u ; si prenda A H =

$\frac{ac}{2b}$

$\frac{ac}{2b}$; si conducano $HM = \frac{b}{2}$, ed MN , una parallela
 a GF , l'altra ad HG , farà in M l'origine delle x po-
 sitive verso N , negative verso O , e le NF saranno
 le y , la superiore positiva, la inferiore negativa. Per
 proprietà poi della Curva abbiamo $\overline{AB}^2 = \overline{AG}^2$;
 $\overline{GF}^2 = \frac{b^3 + aacc}{bb}$; $\frac{b^3 + aac}{b} = 1: \frac{b}{c}$; ma $\overline{AB}^2 =$
 $\frac{b^3 + aacc}{4bb}$; $\overline{AG}^2 = xx - \frac{acx}{b} + \frac{aacc}{4bb}$; $\overline{GF}^2 = yy$
 $+ by + \frac{bb}{4}$; dunque $\frac{b^3 + aacc}{4bb} = xx + \frac{acx}{b} -$
 $\frac{aacc}{4bb}$; $yy + by + \frac{bb}{4} = 1: \frac{b}{c}$, cioè $\frac{bb}{4} - \frac{bxx}{c} +$
 $ax = yy + by + \frac{bb}{4}$; che ci dà finalmente $yy +$
 $by + \frac{bxx}{c} - ax = 0$: il che &c.

P R O B L E M A III.

26. Vogliasi costruire l'Equazione $yy + 2ay$
 $+ xx - cx - aa = 0$, cioè $yy +$
 $2ay = aa + cx - xx$, e sia l'angolo delle Coor-
 dinate x, y retto; essa ci dà $yy + 2ay + aa =$
 $2aa + cx - xx$: si ponga $y + a = z$, sarà zz
 $= 2aa + cx - xx$, cioè $2aa + \frac{c^2}{4} - zz =$

E

xx

$xx - cx + \frac{cc}{4}$; si faccia $x - \frac{c}{2} = u$, avrassi
 $2aa + \frac{cc}{4} - uu = zz$. Qui si vede ad un tratto,
 che tanto il Diametro trasverso, come il conju-
 gato è $= 2V(2aa + \frac{cc}{4})$; essendo l'analogia
 per il Conjugato $1 : x = 2aa + \frac{cc}{4} : 2aa + \frac{cc}{4}$;
 onde $V(2aa + \frac{cc}{4}) =$ Semidiametro conjugato,
 quindi l'Equazione al Circolo; essendosi supposto an-
 che da prima l'angolo delle Coordinate x, y retto
 (num. 23.). Col centro A, Diametro CB =
 $2V(2aa + \frac{cc}{4})$ si descriva il Cerchio CEBD; e
 tirata l'Ordinata FG, che sarà $= z$ stante l'Equa-
 zione ridotta, e AF = u ; si pigli nel Diametro
 CB, AH = $\frac{c}{2}$, e condotte HL = a , e LM, l'
 una parallela a FG, l'altra a FH, sarà in L l'ori-
 gine delle x positive verso M, negative verso la par-
 te opposta; e le MG le y , la superiore positiva, la
 inferiore negativa; imperocchè LM = HF = $u +$
 $\frac{c}{2} = x$, MG = $z - a = y$; ed il Cerchio descrit-
 to sarà il luogo dell'Equazione proposta: poichè ab-
 biamo $\overline{AB}^2 - \overline{AF}^2 = \overline{FG}^2$, cioè $2aa + \frac{cc}{4} - xx$
 $+ cx - \frac{cc}{4} = yy + 2ay + aa$; ch'è lo stesso,
 che

TAV. III.
 Fig. 22.

che $yy + 2ay + xx - cx - aa = 0$; il che &c.

PROBLEMA IV.

27. **D**iafi da costruire la Equazione $yy + \frac{bxy}{a} + \frac{bbxx}{aa} - cy = 0$, cioè $yy + \frac{bxy}{a} = cy - \frac{bbxx}{aa}$; e compiendo il quadrato nel primo membro, farà $yy + \frac{bxy}{a} + \frac{bbxx}{4aa} = cy - \frac{3bbxx}{4aa}$; e fatta la sostituzione di $y + \frac{bx}{2a} = z$, avremo $zz = cy - \frac{3bbxx}{4aa}$; e facendo sparire la y (num. 16.) sostituendo il di lei valore $y = z - \frac{bx}{2a}$, farà $zz = cz - \frac{3bbxx}{4aa} - \frac{bcx}{2a}$, cioè $zz - cz + \frac{cc}{4} = \frac{cc}{4} - \frac{3bbxx}{4aa} - \frac{bcx}{2a}$; e faccendo $z - \frac{c}{2} = p$, si avrà $pp = \frac{cc}{4} - \frac{3bbxx}{4aa} - \frac{bcx}{2a}$, o sia $\frac{aaacc}{3bb} - \frac{4aapp}{3bb} = xx + \frac{2acx}{3b}$; e compiendo il quadrato nell' omogeneo di comparazione $\frac{4aacc}{9bb} - \frac{4aapp}{3bb} = xx + \frac{2acx}{3b} + \frac{aacc}{9bb}$; e fatta finalmente $x + \frac{ac}{3b} = q$, farà $\frac{4aapp}{3bb} = \frac{4aacc}{9bb} - qq$. Sulla retta AG si descriva

TAV. III.
fig. 13.

E 2 il

36 COSTRUZIONE DELL'EQUAZIONI

il triangolo ABE, co i lati $AB = 2a$, $BE = b$,
e si chiami al solito la nota $AE = f$, e l'angolo
ABE sia uguale al complemento a due retti dell'
angolo delle Coordinate x, y . Si prolunghi AB in-
definitamente, nella quale presa $AP = x$, e tirata
PG parallela a BE, sarà $PG = \frac{bx}{2a}$, e $AG =$
 $\frac{fx}{2a}$: nel punto A si alzi $AD = \frac{c}{2}$, e parallela a
PG, essendosi fatta la sostituzione di $z - \frac{c}{2} = p$;
e prolungate le AP, AG dalla parte opposta, si
prenda $AR = \frac{ac}{3b}$, e condotte KK, RN, l'una
parallela a MG, l'altra a PG, sarà $ND = AM =$
 $\frac{cf}{6b}$ per la similitudine de' triangoli ABE, AMR,
quindi $NO = MG = MA + AG = \frac{cf}{6b} +$
 $\frac{fx}{2a}$. Col centro N, Diametro trasverso $KK =$
 $\frac{2cf}{3b}$, conjugato $= \frac{2c}{V3}$ si descriva la Ellissi KZK, fa-
rà essa il luogo dell' Equazione proposta, essendosi
presa $AP = x$, e corrispondendo ad essa due Ordina-
te PZ, PZ, tutte $= y$, la superiore positiva, la
inferiore negativa; imperocchè $OZ = p$, $OG =$
 $\frac{c}{2}$, dunque $ZG = p + \frac{c}{2} = z$: ma $PG = \frac{bx}{2a}$,
dunque $PZ = z - \frac{bx}{2a} = y$. Che se si prendano le
Assisse x negative tra' punti A, Q, corrisponderanno
me-

medesimamente alle stesse due Ordinate y , positiva una, negativa l'altra: prese $= AQ$ corrisponderà una sola Ordinata y positiva; e prese $> AQ$, ma tra' punti Q, ϕ , ne corrisponderanno due, tutte e due positive.

La regola poi di trovare sì il Diametro trasverso, che il conjugato, è la seguente: quanto al primo, si faccia, come il denominatore della frazione che moltiplica la incognita x nella prima sostituzione, alla nota f del triangolo ABE ; così il Diametro trasverso dell'Equazione ridotta, al quarto: questa quarta linea proporzionale sarà costantemente il Diametro trasverso: rispetto al conjugato, si usi la regola data al num. 22. L'analogia adunque per il Dia-

metro trasverso è questa, $2a : f = \frac{4ac}{3b} : \frac{2cf}{3b} =$ al

Diametro trasverso; come si prova ancora dalla proprietà della Curva; imperocchè $\overline{NK}^2 = \overline{NO}^2 : \overline{OZ}^2$

$= \overline{NK}^2 : \frac{cc}{3}$; ma $\overline{NK}^2 = \frac{ccff}{9bb}$, $\overline{NO}^2 = \overline{MG}^2 =$

$\overline{MA} + \overline{AG}^2 = \frac{ccff}{36bb} + \frac{cffx}{6ab} + \frac{ffxx}{4aa}$; $\overline{OZ}^2 =$

$pp = (z - \frac{c}{2})^2 = (y + \frac{bx}{2a} - \frac{c}{2})^2 = yy + \frac{bxy}{a} + \frac{bbxx}{4aa} - cy - \frac{bcx}{2a} + \frac{cc}{4}$; quindi sostituendo

questi valori sarà $\frac{ccff}{9bb} = \frac{ccff}{36bb} - \frac{cffx}{6ab} - \frac{ffxx}{4aa} :$

38 COSTRUZIONE DELL'EQUAZIONI

$yy + \frac{bxy}{a} + \frac{bbxx}{4aa} - cy - \frac{bcx}{2a} + \frac{cc}{4} = \frac{ceff}{9bb}$
 $\frac{cc}{3} = 1 : \frac{3bb}{ff}$; e moltiplicando estremi, e medj, e
 riducendo, si trova la Equazione proposta da co-
 struirsi.

28. Ora per dimostrare ciò, che abbiamo detto
 alla fine del num. 8., bisogna notare, che oltre la
 proprietà da noi considerata nell'Ellissi al num. 5.,
 ella ne gode un'altra; ed è, che il rettangolo me-
 desimo de' segmenti del Diametro è al corrisponden-
 te quadrato dell' Ordinata, come l' Asse, o Diamo-
 tro trasverso è al Parametro. Ritenute adunque le
 stesse denominazioni del numero citato (*Fig. anco
 dello stesso*) e chiamato il Parametro $= p$, sarà l'
 analogia $aa - xx : yy = 2a : p$; quindi l'Equa-
 zione $aa - xx = \frac{2a yy}{p}$; dove si vede che la ra-
 dice quadrata del termine costante è il Semiasse, o
 Semidiametro trasverso: e se il numeratore della
 frazione che moltiplica il quadrato dell' Ordinata
 è $=$ al doppio di essa radice, il denominatore di
 tal frazione sarà $=$ al Parametro: ma quando l'
 Equazione non abbia una tal condizione, il modo
 di trovare il Parametro è di fare, come il numera-
 tore della frazione che moltiplica il quadrato dell'
 Ordinata, è al suo denominatore; così il doppio
 della radice del termine costante, al quarto: que-
 sto quarto termine della proporzione sarà il Parame-
 tro; come per esempio se fosse l'Equazione $bb -$
 $xx = \frac{ceyy}{2ff}$, per lo Parametro si faccia $cc : 2ff =$
2 b

$2b: \frac{4bff}{cc}$; farà dunque il Parametro $= \frac{4bff}{cc}$. Ed infatti. deve essere per proprietà della Curva $bb - xx: yy = 2b: \frac{4bff}{cc} = cc: 2ff$, e però $bb - xx = \frac{ccyy}{2ff}$. Ciò posto: nell' Equazione costruita in

questo Problema, e nell' altre che hanno il piano xy , essendoci noi serviti delli Diametri, due analogie furono istituite, una per lo Diametro trasverso, l' altra pe' l. conjugato: ma volendola riferita (parlando dell' Equazione finale) al Diametro, e Parametro corrispondente, tre è d' uopo farne, una già al solito per lo Diametro trasverso, e due per lo Parametro: imperocchè bisogna prima trovare il Parametro dell' Equazione finale colla regola ora da noi addotta; indi si deve fare, come la nota linea f del triangolo ABE , al denominatore della frazione che moltiplica l' incognita secondo la quale non è ordinata l' Equazione nella prima sostituzione, cioè $2a$, parlando già del presente Problema; così il Parametro dell' Equazione finale ritrovato, al quarto: questo quarto termine sarà sempre il Parametro, che dovrà servire per la costruzione dell' Equazione proposta: ed ecco le tre analogie. Dunque il metodo di servirsi degli Assi, o Diametri è più breve, e più semplice di quello degli Assi, o Diametri, e del Parametro corrispondente: oltre di che si toglie a' principianti la pena di riflettere all' aspetto dell' Equazione finale; ed è più facile il tenerli a memoria quello, che questo..

PRO-

P R O B L E M A V.

29. SIA da costruirsi la Equazione $yy + \frac{2bxy}{a} + xx - ax = 0$, e sia $\frac{bb}{aa} < 1$, cioè $b < a$, farà, compiendo il quadrato, $yy + \frac{2bxy}{a} + \frac{bbxx}{aa} = \frac{bbxx}{aa} - xx + ax$; e fatta la sostituzione di $y + \frac{bx}{a} = z$, avremo $zz = \frac{bbxx - aaxx}{aa} + ax$, cioè, ponendo per brevità $\frac{bb - aa}{aa} = -\frac{mm}{nn}$, $zz = ax - \frac{mmxx}{nn}$, ossia $-\frac{nnzz}{mm} = xx - \frac{annx}{mm}$; e compiendo il quadrato $\frac{aan^4}{4m^4} - \frac{nnzz}{mm} = xx - \frac{annx}{mm} + \frac{aan^4}{4m^4}$, e facendo $x - \frac{ann}{2mm} = u$, farà $\frac{aan^4}{4m^4} - uu = \frac{nnzz}{mm}$. Sia l'angolo delle Ordinate retto: per avere il Diametro trasverso, si faccia $a : f = \frac{aan}{2mm} : \frac{fnn}{2mm}$ = al Semidiametro trasverso (num. 27.); per il conjugato $nn : mm = \frac{aan^4}{4m^4} : \frac{aan}{4mm}$; dunque

$$\frac{an}{2.72}$$

$\frac{a^2}{2m} =$ al Semidiametro conjugato (num. 22.). Sulla TAV. III.
Fig. 24.

retta AP si deferiva il triangolo ABC coi lati AB = a, BC = b, e sia l'angolo ACB retto; è chiaro che la nota linea f sarà = $\sqrt{aa - bb}$; sostituito adunque un tal valore nell'espressione ritrovata del Semidiametro trasverso in luogo di f, e po-

sto pure il valore di $\frac{n^2}{mm} = \frac{a^2}{aa - bb}$, sarà $\frac{f^2 n^2}{2mm} =$

$\frac{a^2}{2 \sqrt{(aa - bb)}}$ ma fatta anche la sostituzione del

valore di $\frac{n}{m} = \frac{a}{\sqrt{(aa - bb)}}$ nell'espressione del Se-

midiametro conjugato, sarà $\frac{a^2 n^2}{2mm} = \frac{a^2}{2 \sqrt{(aa - bb)}}$; dun-

que il Diametro trasverso sarà uguale al Diametro conjugato, e però l'Ellissi passa ad essere un Circolo.

Si prolunghino pertanto AB, AC indefinitamente; e presa AG = x, e condotta DG parallela a BC,

farà DG = $\frac{bx}{a}$, e AD = $\frac{fx}{a}$: dalla AG si tagli

AE = $\frac{a^2 n^2}{2mm}$, farà EG = $x - \frac{a^2 n^2}{2mm} = u$; e per

la somiglianza de' triangoli ABC, LMD (condotta

già LM parallela ad EG) farà LD = $\frac{fx}{a} - \frac{f^2 n^2}{2mm}$

= $\frac{fu}{a}$: tirata per fine LE parallela a BC, col

centro L, Semidiametro AL = $\frac{f^2 n^2}{2mm}$, che tale è

ancora per la similitudine de' triangoli ABC, AEL,

si descriva il Circolo AHPH, nel quale prolunga-

F

ta.

ta dall'una, e l'altra parte fino alla periferia la DG, faranno le GH le y, la superiore positiva, l'inferiore negativa, e alle x sì positive, e sì negative, che però non giungano alla Curva, o vadano fuori di essa, corrisponderanno due Ordinate y, una positiva, l'altra negativa; essendo GH superiore = DH — DG = z — $\frac{bx}{a}$ = y, la GH inferiore = DH

+ DG = $\frac{bx}{a}$ — z = —y. Prese poi le x = EO, corrisponderà ad esse una sola Ordinata OH = —y negativa; prese poi > EO, ma < EZ, corrisponderanno due Ordinate, tutte due negative; quindi il Circolo così descritto farà il luogo dell'Equazione proposta. Il che anco si prova dalla proprietà della Curva; imperocchè nel Circolo, $\overline{LP}^2 - \overline{LD}^2 = \overline{DH}^2$,

$$= zz = (y + \frac{bx}{a})^2; \text{ ma } \overline{LP}^2 = \frac{ff^4}{4m^4} = \frac{a^4 ff}{4(aa-bb)^2},$$

$$\overline{LD}^2 = (\frac{fx}{a} - \frac{fnn}{2mm})^2 = (\frac{fx}{a} - \frac{aaf}{2(aa-bb)})^2,$$

$$\overline{DH}^2 = yy + \frac{2bxy}{a} + \frac{bbxx}{aa}; \text{ dunque } \frac{a^4 ff}{4(aa-bb)^2}$$

$$= \frac{ffxx}{aa} + \frac{affx}{aa-bb} - \frac{a^4 ff}{4(aa-bb)^2} = yy + \frac{2bxy}{a}$$

$$+ \frac{bbxx}{aa}; \text{ e sostituendo il valore di } ff = aa -$$

$$bb, \text{ avremo: } \frac{bbxx - aaxx}{aa} + ax = yy + \frac{2bxy}{a} +$$

$+ \frac{bbxx}{aa}$, cioè finalmente $yy + \frac{2bxy}{a} + xx - ax = 0$: il che &c.

P R O B L E M A VI.

30. *Data di posizione la retta indefinita AP, con un punto fuori di essa C, si cerca il luogo di tutti i punti M tali, da' quali avendo condotte due rette MC, MP, l'una al dato punto C, l'altra perpendicolare ad AP, sia sempre PM = 2CM.* TAV. III. Fig. 25.

Si tiri la AC parallela a PM, e GM parallela ad AP; si chiami $AC = c$, $AP = x$, $PM = y$, sarà $CG = c - y$, e $CM = \sqrt{cc - 2cy + yy + xx}$, e perciò avremo per la condizione del Problema, $y = 2\sqrt{cc - 2cy + yy + xx}$; e quadrando, $yy = 4cc - 8cy + 4yy + 4xx$, cioè $3yy - 8cy + 4xx + 4cc = 0$, e dividendo per 3, $yy - \frac{8cy + 4xx + 4cc}{3} = 0$; trasportando i termini farà $yy - \frac{8cy}{3} = -\frac{4cc - 4xx}{3}$, e compiendo il quadrato nel primo membro, $yy - \frac{8cy}{3} + \frac{16cc}{9} = \frac{4cc}{9} - \frac{4xx}{3}$; si faccia la sostituzione di $y - \frac{4c}{3} = z$, farà $zz = \frac{4cc}{9} - \frac{4xx}{3}$, ch'è lo stesso, che $\frac{3zz}{4} = \frac{cc}{3} - xx$: il Semiasse trasverso è $= \frac{c}{\sqrt{3}}$, il conjugato $= \frac{2c}{3}$ (num. 22.).

F 2

Si

44 COSTRUZIONE DELL'EQUAZIONE

Si prenda $AE = \frac{4^c}{3}$, indi condotta NH parallela ad AP , prese su di essa le parti NE , EH ciascuna $= \frac{c}{\sqrt{3}}$, con questo Semiasse trasverso, e col conjugato ritrovato $= \frac{2^c}{3}$ si descriva l'Ellissi $NOHB$, farà essa il luogo di tutti i punti cercati; imperocchè prolungata PM in F , farà $\overline{EH}^2 - \overline{EF}^2 : \overline{FM}^2 = \frac{c^c}{3} : \frac{4^c c}{9} = \frac{3}{4} : 1$; ma $\overline{EH}^2 = \frac{c^c}{3}$, $\overline{EF}^2 = xx$, $\overline{FM}^2 = \frac{16^c c}{9} - \frac{8^c y}{3} + yy$; dunque avrassi $\frac{c^c}{3} - xx : \frac{16^c c}{9} - \frac{8^c y}{3} + yy = \frac{3}{4} : 1 = 1 : \frac{4}{3}$; e però l'Equazione $yy - \frac{8^c y}{3} + \frac{16^c c}{9} = \frac{4^c c}{9} - \frac{4^c x}{3}$, e riducendo, $yy - \frac{8^c y + 4^c x + 4^c c}{3} = 0$: Equazione ritrovata.

C O R O L L A R I O I.

31. **E'** Chiaro dalla costruzione della figura, che all'Assisse $AP = x$ sì positive, che negative corrispondono sempre due Ordinate y , tutte due positive, l'una, che va alla convessità, l'altra alla concavità della Curva, quando però si prendano le x tra' punti A , Q .

Co-

C O R O L L A R I O II.

32. Poichè $OE = BE = \frac{2c}{3}$, è $CE =$
 $\frac{4c}{3} - c = \frac{c}{3}$, farà $OC = OE + CE$
 $= \frac{2c+c}{3} = c$, e $CB = BE - CE = \frac{2c-c}{3} =$
 $\frac{c}{3}$; quindi $OC \cdot CB = \frac{cc}{3} = \overline{EH}^2$, e però il pun-
 to C farà uno de' fuochi dell' Ellissi per una nota
 proprietà di tal Curva; e presa sull' Assie OB la OL
 $= BC$, farà il punto L l'altro fuoco.



PRO.

P R O B L E M A VII.

33. *Dividere una data retta M N in tre parti continuamente proporzionali.*

TAV. III.
Fig. 26.

Sia $MN = a$, la prima parte $= x$, la seconda $= y$, farà la terza $= \frac{yy}{x}$, e per la condizione del problema si avrà $x + y + \frac{yy}{x} = a$, cioè $yy + xy + xx - ax = 0$; la quale Equazione, facendo noi l'angolo dell'Ordinate al Diametro della figura da descriversi retto, è al Circolo (num. 23.); trasportando dunque i termini, e compiendo il quadrato nel primo membro dell'Equazione, farà $yy + xy + \frac{xx}{4} = ax - \frac{3xx}{4}$; e facendo $y + \frac{x}{2} = z$, avremo $zz = ax - \frac{3xx}{4}$, cioè $-\frac{4zz}{3} = xx - \frac{4ax}{3}$; e compiendo il quadrato nel secondo membro, $-\frac{4zz}{3} = xx - \frac{4ax}{3} + \frac{4aa}{9}$, e fatta $x - \frac{2a}{3} = u$, farà $\frac{4aa}{9} - uu = \frac{4zz}{3}$. Sulla retta AA si descriva il triangolo ABC coi lati $AB = 2$, $BC = 1$, e sia retto l'angolo ACB, farà $AC = \sqrt{3}$. Si prolunghi AQ indefinitamente, e tirata QP parallela a BC, si produca fino alla periferia la stessa QP: indi condotte FD, FN, la prima parallela a BC, l'altra a DQ, e tagliata fuori dalla AQ, AD

$AD = \frac{2a}{3}$, farà (determinata prima $AQ = x$)

$DQ = FN = x - \frac{2a}{3} = u$; $AP = \frac{x\sqrt{3}}{2}$, QP

$= \frac{x}{2}$, $AF = \frac{a}{\sqrt{3}}$, e però $FP = \frac{x\sqrt{3}}{2} - \frac{a}{\sqrt{3}}$.

Col raggio adunque $= \frac{a}{\sqrt{3}}$ si descriva il Circolo

$AMAS$, farà esso il luogo dell'Equazione di sopra

ritrovata: essendo $PM = z$ stante l'Equazione fi-

nale; ma $PQ = \frac{x}{2}$, dunque $QM = z - \frac{x}{2} =$

y , e le DQ , QM le Coordinate dell'Equazione.

Ciò anche si prova dalla proprietà della Curva; im-

perocchè $\overline{AF} - \overline{FP} = \overline{PM}$; ma $\overline{AF} = \frac{a^2}{3}$, $\overline{FP}$

$= \left(\frac{x\sqrt{3}}{2} - \frac{a}{\sqrt{3}} \right)^2 = \frac{3xx}{4} - ax + \frac{a^2}{3}$, $\overline{PM} =$

$\left(y + \frac{x}{2} \right)^2$, dunque $\frac{a^2}{3} - \frac{3xx}{4} + ax - \frac{a^2}{3} = yy$

$+ xy + \frac{x^2}{4}$, cioè $yy + xy + xx - ax = 0$.

Rispetto poi alla corrispondenza delle Ordinate y alle

Affisse x sì positive, come negative, si facciano le stes-

se considerazioni del num. 29.; giacchè il caso è il

medesimo.

Chi però volesse vedere usata la regola da noi in-

segnata al num. 27: per ritrovare tanto il Diametro

trasverso, che il conjugato, onde meglio comprende-

re se l'Equazione sia al Circolo, eccola: per lo Dia-

metro.

metro trasverso si faccia $2 : V_3 = \frac{2^a}{3} : \frac{a}{V_3} =$ Semidiametro trasverso : pe'l conjugato $4 : 3 = \frac{4^a a}{9} : \frac{a^a}{3}$, e però $\frac{a}{V_3} =$ Semidiametro conjugato ; quindi l'Equazione al Circolo (num. 23.).

C A P O T E R Z O.

Dell' Equazioni all' Iperbola , o Iperbole opposte .

34. **L'** Equazioni semplicissime all' Iperbola , o Iperbole opposte sono $\frac{aayy}{cc} = xx -$
 aa ; $\frac{ccyy}{aa} = xx + cc$, la prima per il Diametro primario, l'altra per il secondario; nelle quali si vede chiaramente, che la radice quadrata del termine costante è = al Semiasse, o Semidiametro trasverso; e se il numeratore della frazione, che moltiplica il quadrato dell' Ordinata è tale, che il di lei numeratore sia = al termine costante diviso per una qualunque quantità data, la radice di tal divisore sarà = al Semiasse, o Semidiametro conjugato: ma quando l'Equazione non abbia questa condizione, per ritrovare il Diametro conjugato si faccia ciò, che s'è detto, e fatto rispetto all'Ellissi nel num. 22., senza ripetere le medesime cose, che sono troppo evidenti. Ciò però s'intenda di quelle Equazioni finali provenien-

nienti da quelle primarie, dove non entra il rettangolo xy ; le quali perchè sian all'Iperbola, bisogna che il quadrato dell'incognita, per cui viene ordinata l'Equazione, sia libero da frazione, e col segno positivo, l'altro sia affetto dal negativo, come se fosse

$$yy - 2ay - \frac{aaxx}{2bb} + bx - aa = a.$$

Quanto poi all'altre Equazioni provenienti da queste, in cui cade il rettangolo xy ; le quali perchè sian all'Iperbola, è d'uopo che i quadrati delle incognite sian tutti due affetti del segno positivo; che quello, secondo il quale è ordinata l'Equazione, sia libero da frazione; l'altro poi l'abbia tale, che sia minore del quadrato della metà della frazione che moltiplica il piano xy ; o sia, ch'è lo stesso, che il quadrato della metà della frazione che moltiplica il piano xy , sia maggiore della frazione che moltiplica il quadrato dell'incognita, secondo la quale non è ordinata l'Equazione; come se l'Equazione fosse $yy - \frac{2bxy}{a} + \frac{bbxx}{2aa} - 2ax + cc = 0$. In quanto

poi all'Equazioni finali provenienti da queste, il modo di trovare tanto il Diametro trasverso, che il conjugato, è lo stesso che quello da noi usato per l'Ellissi al num. 27.; nè occorre trattenerfi di nuovo su quello che altre volte si è dichiarato.



G

PRO-

35. **D**Ebbasi costruire l'Equazione $yy - 2cy - \frac{aaxx}{bb} + aa = 0$, o sia $yy - 2cy = \frac{aaxx}{bb} - aa$; si compisca il quadrato nel primo membro, ed avrassi $yy - 2cy + cc = \frac{aaxx}{bb} + cc - aa$; e facendo $y - c = z$, sarà (ponendosi $a > c$, e per brevità $cc - aa = -mm$) $zz = \frac{aaxx}{bb} - mm$, o sia $\frac{bbzz}{aa} = xx - \frac{bbmm}{aa}$: il Semidiametro trasverso è $= \frac{bm}{a}$, il conjugato intero $= 2m$ (num. 22). Col diametro adunque trasverso $AB = \frac{2bm}{a}$,

TAV. III.
Fig. 27.

col conjugato $= 2m$, si descrivano le due Iperbole opposte eguali FAG , LBN , faranno in esse le HG , MN , HF , LM le z , e le GM , CH le x . Si prenda $CO = c$ parallela alle Ordinate, e si conduca OP parallela al Diametro trasverso, sarà in O l'origine delle x , che si fissano positive all'ingiu, e negative all'insù. A queste Assile poi si positive, che negative, prese maggiori di OQ , corrisponderanno sempre quattro Ordinate y , due positive, e due negative, cioè PG , PN faranno le positive; FP , LP le negative; prese poi le $x = OQ$, corrisponderanno ad esse due Ordinate y tutte due positive; prese le x tra' punti T , Q , ne risulteranno quattro y , tutte positive.

ve, due che vanno alla convessità, l'altre due alla concavità della Curva: infatti noi abbiamo $MN = HG = z$; ma $PM = PH = c$, dunque $PN = PG = z + c = y$: al contrario $LM = FH = -z$; dunque $LP = FP = -z - c = -y$; $QN = QG = z + c = y$; e così si discorra delle al-

tre. La proprietà della Curva ci dà $\overline{CM}^2 - \overline{CB}^2$:

$$MN = \frac{4bbmm}{aa} : 4mm; \text{ ma } \overline{CM}^2 = xx, \overline{CB}^2 =$$

$$\frac{bbmm}{aa}, MN = yy - 2cy + cc; \text{ dunque } xx -$$

$$\frac{bbmm}{aa} : yy - 2cy + cc = \frac{4bbmm}{aa} : 4mm = 1:$$

$$\frac{aa}{bb}; \text{ quindi l'Equazione } \frac{aaxx}{bb} - mm = yy - 2cy$$

+ cc: ma si è fatto $cc - aa = -mm$; dunque sostituendo, si avrà finalmente $yy - 2cy -$

$$\frac{aaxx}{bb} + aa = 0 : \text{il che cc.}$$



P R O B L E M A I I.

36. **S**ia data da costruire l'Equazione $yy + 2ay - \frac{axx}{2b} - cx = a$; trasportando i termini, e compiendo il quadrato, avremo $yy + 2ay + aa = aa + cx + \frac{axx}{2b}$; e fatta la sostituzione di $y + a = z$, sarà $zz = aa + cx + \frac{axx}{2b}$, o sia $\frac{2bz}{a} - 2ab = xx + \frac{2bcx}{a}$; e compiendo il quadrato nell'omogeneo di comparazione $\frac{2bz}{a} + \frac{bbcc}{aa} - 2ab = xx + \frac{2bcx}{a} + \frac{bbcc}{aa}$; e fatta la sostituzione di $x + \frac{bc}{a} = u$, e per brevità facendo $\frac{bbcc}{aa} - 2ab = mm$, avremo finalmente $\frac{2bz}{a} = uu - mm$: qui il Diametro trasverso è $= 2m$; il conjugato è $= 2m \sqrt{\frac{a}{2b}}$ (num. 34.). Con questi due Diametri adunque si descrivano le Iperbole eguali opposte FBE, HBM, faranno in esse le FD, DE, HG, GM le z , e le AG, AD le u , una positiva, l'altra negativa, attesa l'Equazione ridotta: ma per la prima sostituzione abbiamo $y = z - a$; dunque presa AP $= a$ parallela alle Ordinate, e condotta per lo punto P la parallela QQ al Diametro BB, faranno le HQ, FQ le y positive, e le QM, QE le y negative: ma per l'al-

TAV. III.
Fig. 28.

l'altra sostituzione si ha pure $x = u - \frac{bc}{a}$; quindi

presa $PS = \frac{bc}{a}$, faranno le SQ , SQ le x , le inferiori positive, le superiori negative. Alle x pertanto positive, e negative maggiori di SL , corrisponderanno sempre due Ordinate y , una positiva, l'altra negativa: alle x poi negative, prese minori di SX , corrisponderanno due Ordinate y tutte due negative: lo stesso si discorra dell'altra Iperbola opposta HBM . E che ciò sia vero, noi abbiamo $FQ = HQ = z - a = y$, $QE = QM = -z + a = -y$; lo stesso si dica dell'altre Ordinate; SQ inferiore $= u - \frac{bc}{a} = x$; SQ superiore $= \frac{bc}{a} - u = -x$. La

proprietà della Curva esige che $\overline{AD}^2 - \overline{AB}^2 : \overline{FD}^2 = 4mm : \frac{4amm}{2b} = 1 : \frac{a}{2b}$; ma $\overline{AD}^2 = xx + \frac{2bcx}{a} + \frac{bbcc}{aa}$, $\overline{AB}^2 = mm$, $\overline{FD}^2 = yy + 2ay + aa$; dunque $xx + \frac{2bcx}{a} + \frac{bbcc}{aa} - mm : yy + 2ay + aa = 1 : \frac{a}{2b}$, e però l'Equazione $\frac{axx}{2b} + cx + \frac{bcc}{2a} - \frac{amm}{2b} = yy + 2ay + aa$; e sostituito il valore di $mm = \frac{bbcc}{aa} - 2ab$, si avrà $\frac{axx}{2b} + cx + aa = yy + 2ay + aa$, ch'è lo stesso che $yy + 2ay - \frac{axx}{2b} - cx = 0$.

Se

Se fosse stata la quantità $\frac{bbcc}{aa} < 2ab$; in tal caso $\frac{bbcc}{aa} - 2ab = -mm$, e però la finale Equazione $\frac{2bz}{a} = uu + mm$; che è al secondo Dia-

TAV. III.
Fig. 29.

metro. Cogli stessi due Diametri ME, BI, l'uno come secondario, l'altro primario si descrivano le due eguali Iperbole opposte GEA, DML, presa una qualunque Assissa HN = u , le corrispondenti Ordinate ND, NL saranno le z positive, e negative, attesa l'Equazione ridotta. Condotta per il punto P una parallela QPQ al Diametro EM, presa però prima HP = a ; indi tagliata fuori PS = $\frac{bc}{a}$, sarà SQ a destra = $u - \frac{bc}{a} = x$ positiva, e SQ a sinistra = $\frac{bc}{a} - u = -x$ negativa. Si avrà perciò nel punto S l'origine delle x , alle quali prese sì positive, che negative, maggiori di SO, ma minori di ST, corrisponderanno quattro Ordinate y tutte negative; prese poi sì positive, che negative = ST, lor corrisponderanno due Ordinate negative; prese finalmente maggiori di ST, ne corrisponderanno ancora quattro, due superiori negative, due inferiori positive; imperocchè abbiamo QD = QA = $z - a = y$, QL = QG = $a - z = -y$, e così si discorra delle altre. Qui abbiamo per proprietà della Curva $\overline{HN}^2 + \overline{HM}^2 : \overline{ND}^2 = \overline{ME}^2 : \overline{BI}^2$ (num. 6., e 34.); e sostituendo i valori analitici $uu +$

mm :

$mm: \tau\tau = 4mm: \frac{4amm}{2b} = 1: \frac{a}{2b}$, e mettendo i valori di $mm = 2ab - \frac{bbcc}{aa}$, di $uu = (x + \frac{bc}{a})^2$, di $\tau\tau = (y + a)^2$, moltiplicando estremi, e medj, risulterà ancora la Equazione proposta da costruirsi.

P R O B L E M A III.

37. **A** Bbiassi a costruire la Equazione $yy - 2cy - xx + 2bx = 0$, cioè $yy - 2cy = xx - 2bx$; e compiendo il quadrato nel primo membro $yy - 2cy + cc = xx - 2bx + cc$, e facendo $y - c = z$, avremo $\tau\tau = xx - 2bx + cc$, ovvero $\tau\tau - cc = xx - 2bx$; e compiendo il quadrato nell'omogeneo di comparazione, $\tau\tau + bb - cc = xx - 2bx + bb$; e fatta la sostituzione di $x - b = u$, e ponendo per brevità $bb - cc = mm$, si avrà $\tau\tau = uu - mm$. Qui si vede ad un tratto, che l'Equazione è all'Iperbola equilatera: imperocchè il Diametro trasverso è $= 2m = 2V(bb - cc)$, e l'analogia pe'l conjugato è, (num. 22., 34.) $1: 1 = mm: mm$; e però $2m = 2V(bb - cc) =$ al Diametro conjugato $=$ al Diametro trasverso, quindi l'Iperbola è equilatera (num. 6.). Col Diametro trasverso $AF =$ al conjugato $= 2V(bb - cc)$, si descrivano le due Iperbole opposte eguali CAD, GFI ; presa una qualunque Assisa EB positiva $= u$, e EH negativa $= -u$, le corrispondenti Ordinate saranno le z positive, e negative, attesa l'Equazione finale: ma per la prima so-

TAV. III.
Fig. 3a.

sostituzione abbiamo $y - c = z$; quindi presa $MB = c$, $EK = b$, e condotta LM parallela al Diametro AF , prolungata da una e l'altra parte, sarà LM inferiore $= u + b = x$ positiva, LM superiore $= EH - EK = -u - b = -x$ negativa: farà dunque nel punto L l'origine delle x , le positive tirate all'ingiù, le negative all'insù. A tali Assisse adunque positive maggiori di LO , ma minori di LN , corrisponderanno due Ordinate y tutte due positive, l'una che termina alla convessità, l'altra alla concavità della Curva; prese le $x = LN$, corrisponderà ad esse una sola Ordinata ND positiva, e prese maggiori di LN , ne corrisponderanno due, l'una come CM negativa, l'altra come MD positiva. Istessamente nell'altra Iperbola opposta, alle x positive prese fra i punti L, Q corrisponderanno ad esse due Ordinate y tutte due positive, l'una che va alla convessità, l'altra alla concavità della Curva: Alle x poi negative corrisponderanno di nuovo due Ordinate, l'una come GM negativa, l'altra come MI positiva: infatti $SV = S\Omega + V\Omega = c + z = y$; $ST = S\Omega - T\Omega = c + z = y$, essendo $T\Omega = -z$; $ND = NB + BD = c + z = y$; lo stesso si dica di MD ; $CM = CB - MB = -z - c = -y$: in simil forma si discorra dell'altra Iperbola opposta GFI . Qui abbiamo per proprietà della Curva $\overline{EB} - \overline{EA} = \overline{CB}$; ma $\overline{EB} = (x - b)^2$, $\overline{EA} = mm = bb - cc$, $\overline{CB} = (c - y)^2$, e però $xx - 2bx + bb - bb + cc = yy - 2cy + cc$, cioè $yy - 2cy - xx + 2bx = 0$: il che &c.

Co.

C O R O L L A R I O.

38. **P**ER la qual cosa venendoci proposta un'E-
quazione, nella quale non entri il piano
 xy , ed abbia il quadrato xx negativo, e libero da fra-
zione, dobbiamo tosto dire, ch'ella è alla Iperbola
equilatera, come ora si è veduto.

P R O B L E M A I V.

39. **S**IA da costruirsi l'Equazione $yy - \frac{2bxy}{a} + 2ay - cc = 0$; la quale già chiaramente si ve-
de, ch'è all'Iperbola, perchè $\frac{bb}{aa}$, quadrato della me-
tà del coefficiente del rettangolo xy , è maggiore di
zero, coefficiente in questo caso del quadrato xx ;
poichè non essendovi nell'Equazione questo quadrato,
esso si considera come moltiplicato per lo zero. Ora
trasportando i termini, e compiendo il quadrato nel
primo membro, sarà $yy - \frac{2bxy}{a} + \frac{bbxx}{aa} = \frac{bbxx}{aa}$
 $- 2ay + cc$: si ponga $y - \frac{bx}{a} = z$, avremo $zz =$
 $\frac{bbxx}{aa} - 2ay + cc$; e facendo sparire la y (num.
16.) sarà $zz = \frac{bbxx}{aa} - 2az - 2bx + cc$, cioè
 $zz + 2az = \frac{bbxx}{aa} - 2bx + cc$; e compiendo il

H

qua-

quadrato nel primo membro $zz + 2az + aa = \frac{bbxx}{aa}$
 $- 2bx + cc + aa$; e facendo $z + a = u$,
 avrassi $uu = \frac{bbxx}{aa} - 2bx + cc + aa$, cioè
 $\frac{aa uu - aacc - a^4}{bb} = xx - \frac{2aax}{b}$; e compiendo il
 quadrato nell'omogeneo di comparazione $\frac{aa uu - aacc}{bb}$
 $= xx - \frac{2aax}{b} + \frac{a^4}{bb}$, e fatta $x - \frac{aa}{b} = p$, farà

TAV. IV. finalmente $\frac{aa uu}{bb} = pp + \frac{aacc}{bb}$. Sulla retta AG si
 Fig. 31. descriva il triangolo ACB a destra, per essere il
 termine $\frac{2bxy}{a}$ negativo nell'Equazione proposta; il
 qual triangolo abbia i lati $AB = a$, $BC = b$, e
 la nota AC sia $= f$, e l'angolo ABC $=$ all'an-
 golo delle Coordinate x, y : si prolunghino AC, AB
 indefinitamente, e vadano in G, L; si tiri GL pa-
 rallela a BC, presa una qualunque $AL = x$, farà
 $GL = \frac{bx}{a}$, $AG = \frac{fx}{a}$: si conduca $AM = a$, a
 destra di AG (essendo stata la seconda sostituzione
 di $z + a = u$) e parallela a GL; indi condotta
 MH parallela ad AG, tagliata fuori dalla AL,
 $AD = \frac{aa}{b}$, attesa la sostituzione fatta di $x -$
 $\frac{aa}{b} = p$; e si dovrebbe tirare AD dalla parte oppo-

sta

sta di AL, se la sostituzione fosse stata di $x + \frac{aa}{b}$
 $= p$; sarà DL $= x - \frac{aa}{b} = p$; e guidate le FE,
 FH, l'una parallela a GL, l'altra a DL, sarà
 $FG = EH = \frac{fx}{a} - \frac{af}{b}$ per la somiglianza de'
 triangoli ABC, FHG. Col centro dunque E, Dia-
 metro secondario OM $= \frac{2cf}{b}$ (num. 27., 34.) pri-
 mario conjugato $= 2c$, (num. 22., 34.) si descri-
 vano le due Iperbole opposte eguali VNQ, RPT;
 saranno esse il luogo dell' Equazione proposta. Im-
 perocchè è per proprietà della Curva (num. 6.)

$$\overline{EO}^2 + \overline{EH}^2 : \overline{HV}^2 = \frac{4cfff}{bb} : 4cc = 1 : \frac{bb}{ff}; \text{ ma}$$

$$\overline{EO}^2 = \frac{cfff}{bb}, \overline{EH}^2 = \left(\frac{fx}{a} - \frac{af}{b} \right)^2, \overline{HV}^2 =$$

$$\left(y - \frac{bx}{a} + a \right)^2 \text{ (che HV sia } = y - \frac{bx}{a} + a$$

è chiaro; imperocchè HV = u stante l'Equazione
 ridotta; ma $u = z + a$, e $z = y - \frac{bx}{a}$, dun-
 que HV $= u = z + a = y - \frac{bx}{a} + a$): so-

stituiti pertanto i valori analitici nell' analogia espri-
 mamente la proprietà della Curva, moltiplicando estre-
 mi, e medj, e riducendo i termini, si troverà l'E-
 quazione proposta. Alle x poi sì positive, che nega-
 tive corrisponderanno due Ordinate y superiormente,

H 2

l' una

60 COSTRUZIONE DELL'EQUAZIONI

l'una a destra, come LT negativa, l'altra, come LV positiva; due altre inferiormente, positiva l'una, negativa l'altra: ed infatti $LV = HV - HG + GL = u - a + \frac{bx}{a}$; ma $u = z + a = y - \frac{bx}{a} + a$; dunque $LV = y - \frac{bx}{a} + a - a + \frac{bx}{a} = y$: al contrario $LT = HT + GH - GL = -u + a - \frac{bx}{a}$; ma $-u = -z - a = \frac{bx}{a} - y - a$; dunque $LT = \frac{bx}{a} - y - a + a - \frac{bx}{a} = -y$. Similmente $LQ = QY - GY - LG = u - a + \frac{bx}{a}$, essendo $LG = -\frac{bx}{a}$ per i triangoli simili ABC, AGL; e di più $AL = -x$; dunque come prima $LQ = y$. Al contrario $LR = YR + YG + LG = -u + a - \frac{bx}{a}$, e però come prima $= -y$. Prolungate in oltre le x superiormente, e inferiormente, positive, e negative, in modo che tocchino le due mezzeperebole opposte PT, QN, corrisponderanno ad esse due Ordinate sole, l'una come LV = y positiva, l'altra come LR = -y negativa, cadendo in tal caso, come è chiaro, il punto L in T, e l'altro L in Q: prodotte poi in modo, che taglino le due accennate mezzeperebole, corrisponderanno alle stesse quattro Ordinate y, due superiormente positive, l'una, che va alla concavità della mezzeperebola PT, l'altra alla convessità dell'altra mezza VN; due.

due altre inferiormente negative, l'una che va alla concavità della mezza Iperbola NQ, l'altra alla convessità dell'altra mezza Iperbola PR.

P R O B L E M A V.

40. **D**Ebbasi costruire l'Equazione $yy - \frac{2bxy}{a} + \frac{bbxx}{2aa} + cy - ax = 0$, o sia $yy - \frac{2bxy}{a} + \frac{bbxx}{2aa} + cy - ax = 0$, e compiendo il quadrato nel primo membro $yy - \frac{2bxy}{a} + \frac{bbxx}{2aa} = \frac{bbxx}{2aa} - cy + ax$; e fatta la sostituzione di $y - \frac{bx}{a} = z$, sarà $zz = \frac{bbxx}{2aa} - cy + ax$; e facendo sparire la y (num. 16.) $zz = \frac{bbxx}{2aa} - cz - \frac{bcx}{a} + ax$; e ponendo per brevità $\frac{aa - bc}{a} = m$, si avrà $zz + cz = \frac{bbxx}{2aa} + mx$; e compiendo il quadrato nel primo membro $zz + cz + \frac{c^2}{4} = \frac{bbxx}{2aa} + mx + \frac{c^2}{4}$; e fatta la sostituzione di $z + \frac{c}{2} = p$, sarà $\frac{2aapp}{bb} = xx + \frac{2aamx}{bb} + \frac{aaec}{2bb}$, cioè $\frac{2aapp}{bb} - \frac{aaec}{2bb} = xx + \frac{2aamx}{bb}$; e compiendo il quadrato nell'omoge-

ne

62 COSTRUZIONE DELL'EQUAZIONI

neo di comparazione $\frac{2aapp}{bb} + \frac{a^4mm}{b^4} - \frac{aacc}{2bb} = xx$
 $+ \frac{2aamx}{bb} + \frac{a^4mm}{b^4}$; e facendo la sostituzione di x
 $+ \frac{aam}{bb} = q$, e ponendo per brevità $\frac{a^4mm}{b^4} - \frac{aacc}{2bb}$,
 $= nn$, farà finalmente $\frac{2aapp}{bb} = qq - nn$.

TAV. IV.
Fig. 31.

Sulla retta QF si descriva il triangolo AMN, coi lati AM = a , MN = b , e la nota AN sia = f , e l'angolo AMN = all'angolo delle Coordinate dell'Equazione proposta: si prolunghi AM da una e l'altra parte, si tiri PF parallela a MN; presa pertanto AP = x , farà PF = $\frac{bx}{a}$; s'abbassi la AH già parallela a PF, e = $\frac{c}{2}$, essendosi fatta la sostituzione di $x + \frac{c}{2} = p$, e condotta per il punto H parallela a QF la retta ES, si pigli la AK = $\frac{aam}{bb}$ per la sostituzione fatta di $x + \frac{aam}{bb} = q$, e si lasci cadere fino in O la retta KQ parallela a MN, farà AF = $\frac{fx}{a}$, AQ = OH = $\frac{afm}{bb}$, e però OE = OH + HE = QF = $\frac{fx}{a} + \frac{afm}{bb}$. Col centro O, Semidiametro trasverso OZ = $\frac{fn}{a}$ (num. 27.34.) col Diametro conjugato = $\frac{bn}{a} \sqrt{2}$ (num. 22., 34.) si de-
scri-

scriva la Iperbola GZG, farà essa il luogo dell' Equazione proposta; imperocchè GE superiore = p , stante l' Equazione ridotta; ma FE = AH = $\frac{c}{2}$, dunque FG = GE — EF = $p - \frac{c}{2} = z$; ma

è pure PF = $\frac{bx}{a}$, dunque GP = $z + \frac{bx}{a} = y$ positiva, e la PG inferiore = $-y$ negativa, dacchè GE inferiore = $-p$, dunque FG = $\frac{c}{2} - p = -$

z , e però PG = $-z - \frac{bx}{a} = -y$. Alle Assisse x pertanto prese $> AB$, corrisponderanno ad esse due Ordinate y , l'una positiva, l'altra negativa; prese = AB , corrisponderà una sola Ordinata BG negativa, perchè GE = $-p$, e però GF = $-p + \frac{c}{2} = -z$; onde BG = $-z - \frac{bx}{a} = -y$; prese tra i punti V, B, ne corrisponderanno due, tutte e due negative, l'una che va alla convessità, l'altra alla concavità della Curva. Il simile si dica dell'altra Iperbola opposta, che per motivo di brevità non s'è descritta. Per proprietà della Curva abbiamo

$$\overline{OE}^2 - \overline{OZ}^2 : \overline{EG}^2 = \frac{4ffnn}{aa} : \frac{2bbnn}{aa} = 1 : \frac{bb}{2ff}; \text{ ma.}$$

$$\overline{OE}^2 = \overline{QF}^2 = (QA + AF)^2 = \frac{ffxx}{aa} + \frac{2ffmx}{bb} + \frac{aa f f m m}{b^4}; \overline{OZ}^2 = \frac{ffnn}{aa}, \overline{GE}^2 = (y - \frac{bx}{a} + \frac{c}{2})^2$$

=

64 COSTRUZIONE DELL' EQUAZIONE

$= yy - \frac{2bxy}{a} + \frac{bbxx}{aa} + cy - \frac{bcx}{a} + \frac{cc}{4}$; dunque
 l'analogia sarà $\frac{ffxx}{aa} + \frac{2ffmx}{bb} + \frac{aaffmm}{b^4} = \frac{ffnn}{aa}$;
 $yy - \frac{2bxy}{a} + \frac{bbxx}{aa} + cy - \frac{bcx}{a} + \frac{cc}{4} = 1: \frac{bb}{2ff}$;
 e moltiplicando estremi, e medj, sarà $\frac{bbxx}{2aa} + mx +$
 $\frac{aamm}{2bb} - \frac{bbnn}{2aa} = (y - \frac{bx}{a} + \frac{c}{2})^2$; e mettendo
 il valore di $nn = \frac{a^4mm}{b^4} - \frac{aacc}{2bb}$; avremo $\frac{bbxx}{2aa}$
 $+ mx + \frac{cc}{4} = (y - \frac{bx}{a} + \frac{c}{2})^2$, e sostituendo
 in fine il valore di $m = a - \frac{bc}{a}$, sarà $\frac{bbxx}{2aa} + ax$
 $- \frac{bcx}{a} + \frac{cc}{4} = yy - \frac{2bxy}{a} + \frac{bbxx}{aa} + cy - \frac{bcx}{a}$
 $+ \frac{cc}{4}$; e trasportando, e riducendo i termini, avraf-
 fi finalmente $yy - \frac{2bxy}{a} + \frac{bbxx}{2aa} + cy - ax = 0$:
 il che &c.



PRO-

PROBLEMA VI.

41. *Data la Parabola BAC si dimanda il luogo di tutti i punti M tali, che avendo condotte da ciascheduno di questi punti due tangenti MB, MC, l'angolo BMC, ch'esse comprendono sia = a qualsivoglia dato angolo ottuso.* TAV. IV.
Fig. 33.

A Vendo condotto l'Asse AD della Parabola data, che incontri ne' punti F, G le due tangenti MB, MC, si tireranno da' punti del contatto B, C, e da quelli del concorso M le perpendicolari BD, EC, PM; indi guidata MN, che faccia full'Asse AD l'angolo FNM eguale al complemento a due retti dell'angolo dato BMC, ovvero eguale all'angolo FMG opposto al vertice dell'altro BMZ: si chiamino le indeterminate $AP = x$, $PM = y$, $AF = s$, $AG = t$, e il Parametro dell'Asse AD sia uguale ad a , poichè egli è dato, essendo data per ipotesi la Parabola BAC. Ciò dunque posto: si

avrà $FM = ss - 2sx + xx + yy$, a causa del triangolo rettangolo FPM; quindi $FM = \sqrt{ss - 2sx + xx + yy}$; ma per la somiglianza de' triangoli FGM, FMN, abbiamo $FG : FM = FM : FN$; dunque $\frac{ss - 2sx + xx + yy}{s - t} = FN$; e però

$$PN = FN - FP = \frac{ss - 2sx + xx + yy}{s - t} - s$$

$$+ x = \frac{ss - sx - tx + xx + yy}{s - t}. \text{ Ora per la simi-}$$

I

litq.

litudine de' triangoli FPM, FDB, abbiamo $FP : PM = FD : DB$; ma $FP = s - x$, $PM = y$, $FD = 2s$ per una nota proprietà della Parabola, come sottotangente rispetto alla tangente BF, $BD = \sqrt{as}$ (num. 4.) dunque $s - x : y = 2s : \sqrt{as}$; e

quadrando $(s - x)^2 : yy = 4ss : as = 4s : a$; e moltiplicando estremi, e medj, e riducendo, si ha $ss - 2sx - \frac{4yy}{a} + xx = 0$. Istessamente la similitudine de' trian-

goli GPM, GEC, ci dà $GP : PM = GE : CE$; ma $GP = x - t$, $PM = y$, $GE = 2t$, come sottotangente rispetto la tangente GC; $CE = \sqrt{at}$ (num. 4.); dunque $x - t : y = 2t : \sqrt{at}$; e quadran-

do $(x - t)^2 : yy = 4tt : at = 4t : a$; per la quale analogia abbiamo l'Equazione $tt - 2tx - \frac{4ty}{a} + xx$

$= 0$; e facendo per comodità di calcolo $p = 2x + \frac{4yy}{a}$, la prima Equazione diverrà $ss - ps + xx$

$= 0$, la seconda $tt - pt + xx = 0$; e sottraendo la seconda Equazione dalla prima, s'avrà $ss - tt - ps + pt = 0$, cioè $ss - tt = ps - pt$; e divi-

dendo per $s - t$, $s + t = p$, e però $s = p - t$, e $ss = ps - ts = ps - xx$, a causa della prima Equazione $ss - ps + xx = 0$; quindi $ps - ts = ps - xx$, e però $ts = xx$, e $4ts = 4xx$; ma

$ss + 2st + tt = pp$, dunque $ss + 2st + tt - 4st = pp - 4xx$, cioè $ss - 2st + tt = pp - 4xx$, e $s - t = \sqrt{(pp - 4xx)} =$

$\frac{4y\sqrt{ax + yy}}{a}$; sostituendo in vece di p il di lei valore

re $2x + \frac{4yy}{a}$; onde mettendo nell'algebraica espressione di PN sopra ritrovata i valori di $s + t$, st , e $s - t$, che sono $2x + \frac{4yy}{a}$, xx , e $\frac{4y\sqrt{ax+yy}}{a}$.

avremo $\frac{ay - 4xy}{4\sqrt{ax+yy}} = PN$. Ora prendendo sull'Asse la parte $NQ = a =$ al Parametro della Parabola; e conducendo QT parallela a PM che incontri in T la NM prolungata quanto sarà bisogno, è chiaro che la linea QT sarà data; poichè nel triangolo QTN, gli angoli TQN, TNQ sono dati, essendo il primo retto, e l'altro = all'angolo FMG = ZMB, cioè uguale al complemento a due retti dell'angolo ottuso dato BMC; e di più NQ è nota per essersi presa uguale al Parametro della Parabola. Si chiami dunque $QT = b$, e per i triangoli rettangoli PMN, NQT,

si avrà l'analogia $PN \left(\frac{ay - 4xy}{4\sqrt{ax+yy}} \right) : PM(y) = a : b$; e dividendo la prima ragione per y , $\frac{a - 4x}{4\sqrt{ax+yy}}$; $i = a : b$, e però l'Equazione $ab - 4bx = 4a\sqrt{ax+yy}$; e togliendo l'asimmetria, e riducendo l'Equazione allo zero, $yy - \frac{bbxx}{aa} + ax +$

$\frac{bbx}{2a} - \frac{bb}{16} = 0$; la quale maneggiata giusta al solito,

e fatta la sostituzione di $\frac{2a^3 + ab^2}{4bb} = x = -u$,

si ridurrà $\frac{aayy}{bb} = uu - \frac{a^6 - abbb}{4b^4}$. Sull'Asse A D della

63 COSTRUZIONE DELL'EQUAZIONI

Parabola si pigli $AH = \frac{2a^3 + abb}{4bb}$; col centro H,

Affe trasverso. $= \frac{aa \cdot V(aa + bb)}{bb} = IK$, col con-

jugato $\Phi O = \frac{a \cdot V(aa + bb)}{b}$ (num. 22., 34.) si de-

scriva la Iperbola $Y M \Omega$, sarà essa il luogo della Equa-

zione ritrovata: qui s'avverta, che $HP = -u$, giac-

chè questo è arbitrario, ed è lo stesso $(x - \frac{2a^3 + abb}{4bb})^2$,
che $(\frac{2a^3 + abb}{4bb} - x)^2$. La proprietà della Curva

ci dà $HP - IH: PM = \frac{a^6 + a^4bb}{b^4} : \frac{a^4 + aabb}{bb}$

$= aa:bb$; ma $HP^2 = (\frac{2a^3 + abb}{4bb} - x)^2$, IH^2

$= \frac{a^6 + a^4bb}{4b^4}$, $PM = yy$; sostituendo pertanto

questi valori nell'analogia ora istituita, moltiplicando
estremi, e medj, si troverà l'Equazione, che si è
costruita.

C O R O L L A R I O.

42. **C**Onducendosi la retta IO ; sarà nel triangolo
rettangolo IHO , $IO = V(IH^2 + HO^2) =$

$\frac{a^3 + abb}{2bb}$; quindi trasportando la retta IO nel Se-

miasse HI , principiando in H , e venendo in giù, il
pua.

ALLE SEZIONI CONICHE. 69

punto R, in cui cadrà il termine della retta IO, farà il fuoco sì dell'Iperbola, come della Parabola;

essendo $KR = \frac{a^3 + abb + aa\sqrt{aa + bb}}{2bb}$, $RI =$

$\frac{a^3 + abb - aa\sqrt{aa + bb}}{2bb}$) e però $KR \cdot RI =$

$\frac{a^4 + aa\cancel{bb}}{4bb} = HO$; quindi per una nota proprietà

dell'Iperbola, farà il punto R il fuoco di tal Curva: rispetto alla Parabola, $AR = RH - AH =$

$\frac{a^3 + abb}{2bb} - \frac{2a^3 - abb}{4bb} = \frac{a}{4}$, cioè: uguale alla

quarta parte del Parametro della Parabola; adunque (num. 20.) farà anche il punto R il di lei fuoco.



PRO-

P R O B L E M A VII

TAV. IV.
Fig. 34.

43. *Dato un Circolo, che abbia per centro il punto A, e per raggio la retta AM con due punti E, F sul medesimo piano: trovare sulla periferia al di dentro dell'angolo EAF, il punto M tale, che avendo condotto le rette AM, EM, ME, li due angoli AME, AMF siano tra loro uguali. Si supponga, che le linee EA, AF siano disuguali; perchè se fossero eguali, è chiaro per i semplici Elementi di Geometria, che la retta secante in due parti uguali l'angolo EAF soddisfarebbe al quesito, tagliando la periferia nel punto ricercato: ed in oltre per maggiore chiarezza si ponga, che $AE < AF$.*

D Al punto ricercato M si tirino le rette MB, MD, che facciano nelle AF, AE gli angoli MBA, MDA eguali agli angoli AMF, AME, e per conseguenza tra loro eguali; a causa de' triangoli simili AFM, AMB, si avrà $AF:AM = AM:AB$; così pure per i triangoli simili AME, AMD, sarà $AE:AM = AM:AD$. Ma poichè le linee AF, AE sono date insieme col raggio AM, le parti AB, AD delle rette AF, AE saranno pure date. Condotte le rette MP, MQ parallele ad AE, AF, i triangoli BPM, DQM saranno simili; poichè gli angoli PBM, QDM sono eguali, essendo i complementi a due retti degli angoli eguali MBA, MDA: si chiamino adunque le rette $AB = a$, $AD = b$, e le indeterminate AP = QM.

$= QM = x$, $PM = AQ = y$; quindi sarà BP
 $(x - a) : PM (y) = DQ (y - b) : QM (x)$; e
 però l'Equazione $xx - ax = yy - by$, cioè $yy -$
 $by - xx + ax = 0$, ch'è all'Iperbola equilatera
 (num. 38.): la quale col metodo solito si riduce (fa-

cendo le due sostituzioni di $y - \frac{b}{2} = z$, e di $x -$

$\frac{a}{2} = u$) $zz = uu + \frac{bb - aa}{4}$. Siano prese sulle
 rette AF , AE le parti AB , AD terzè proporzio-
 nali ad AF , AM , ed AE , AM ; si conduca per il
 punto di mezzo C della retta BD una retta indefi-
 nita CH parallela ad AB , sulla quale si prenda la
 parte $CK = \frac{\sqrt{bb - aa}}{2} =$ all'uno, e l'altro del-

li due Semidiametri conjugati: la linea poi $AD =$
 b , sarà maggiore di $BA = a$, perchè si è posto
 $AF > AE$. Col centro C , e colla metà del secon-
 do Diametro; cioè colla retta CK , si descriva la
 Iperbola equilatera MD , colle Ordinate HM paral-
 lele ad AD , dico che essa incontrerà la circonferen-
 za del Cerchio dato al punto cercato M : imperocchè
 conducendo CL parallela ad AD , è chiaro che AL
 $= LB$, e $AO = OD$, perchè nel punto C è ta-
 gliata pel mezzo la retta DB ; quindi $CH = AP$
 $- AL = x - \frac{a}{2}$, $HM = AQ - AO = y -$

$\frac{b}{2}$: ora per proprietà dell'Iperbola equilatera abbiamo

$\overline{HM}^2 = \overline{CH}^2 + \overline{CK}^2$ (num. 6.) cioè, in termini ana-

litici

litici $yy - by + \frac{bb}{4} = xx - ax + \frac{aa}{4} + \frac{bb}{4} - \frac{aa}{4}$,
cioè $yy - by - xx + ax = 0$: il che &c.

C A P O Q U A R T O .

*Dell' Equazioni all' Iperbola fra gli
Assintoti .*

44. **L'** Equazione semplicissima all' Iperbola fra gli Assintoti, abbiamo veduto al num 6., ch' ella è $xy = ab$, in cui si vede, che il termine cognito è uguale al rettangolo costante; il che pure si verifica in tutte le altre Equazioni ridotte, provenienti da quelle, che non hanno alcuno de' quadrati delle incognite, le quali perchè siano alla Iperbola tra gli Assintoti, è necessario che il rettangolo xy sia positivo, e libero da frazione, e che negli altri termini ci sia il rettangolo delle costanti in una, o l' altra, o anche in tutte e due le incognite; come per esempio se l' Equazione fosse $xy - ay + cx - aa = 0$. Quant o poi all' altre, cioè a quelle, nelle quali ci cade o l' uno, o l' altro de' quadrati delle Coordinate; che ciò è appunto, onde si differenziano dall' altre Equazioni, che soglionfi regolarmente proporre, il metodo di trovare il rettangolo costante si darà al num. 47.



P R O .

PROBLEMA I.

45. SIA proposta da costruirsi l'Equazione $xy + ax - cc = 0$, ovvero $xy + ax = cc$, si ponga $y + a = z$, e sarà $xz = cc$. Col centro A tra gli Assintoti CB, DE comprendenti il dato angolo delle Coordinate si descrivano le due Iperbole opposte FG, HL del rettangolo costante $= cc$, presa una qualunque AM $= x$, sarà la corrispondente Ordinata MN $= z$ in forza dell'Equazione ridotta; ma per la sostituzione abbiamo $y = z - a$, fatta MO $= a$, e condotta OP parallela all'Assintoto CB, sarà PO $= AM = x$, ON superiore $= z - a = y$, ON inferiore $= a - z = -y$. Sarà dunque nel punto P l'origine delle x , positive verso O, negative alla parte opposta; alle quali, prese positive tra i punti P, G, e sieno uguali a PO, corrisponderanno due Ordinate y , l'una superiore positiva, l'altra inferiore negativa: prese $= PG$, ne corrisponderà una sola Ordinata GN negativa $= -y$; prese poi maggiori di PG, e sieno uguali a PQ, ne corrisponderanno due, tutte due negative, l'una che va alla concavità dell'Iperbola superiore, l'altra alla convessità della inferiore; ed in fatti la minore QN $= a - z = -y$, QN maggiore $= -z + a = -y$; lo stesso si dica dell'altra Iperbola opposta HL. La proprietà della Curva richiede, che $AM \cdot MN = cc$; ma $AM = x$, $MN = y + a$; dunque $xy + ax = cc$, cioè $xy + ax - cc = 0$: il che &c.

TAV. IV.
Fig. 35.

K

PRO-

P R O B L E M A II.

46. **A** Bbiassi a costruire l'Equazione $xy - 2ax = cy - ab$; si faccia $y - 2a = z$, sarà $xz = cy - ab$; e facendo sparire la y , mettendone il di lei valore, che si cava dalla sostituzione fatta, cioè $y = z + 2a$, avrassi $xz = cz + 2ac - ab$, ossia $xz - cz = 2ac - ab$; e fatta finalmente l'altra sostituzione di $x - c = u$, sarà $uz = 2ac - ab$. Si supponga, che sia $2c > b$, cioè positivo il rettangolo costante: fra gli Assintoti DE, AC, comprendenti il dato angolo delle Coordinate, si descrivano le Iperbole opposte FG. HI del rettangolo costante $2ac - ab$; presa una qualunque BK = u , sarà la corrispondente Ordinata KL = z , stante l'Equazione ridotta; ma per le due sostituzioni fatte, abbiamo $x = u + c$, e $y = z + 2a$; adunque, presa MB = $2a$, e condotta per il punto M la parallela NO all'Assintoto AC, e prolungata LK in P, indi presa MQ = c , sarà QP = $u + c = x$ positiva, PL = $z + 2a = y$. Sarà pertanto in Q l'origine delle x , positive a destra, negative a sinistra; alle quali, prese positive tra' punti M, R, corrisponderanno due Ordinate y , la superiore, come abbiamo veduto, positiva, la inferiore PL negativa; perchè questa è $= -z - 2a = -y$; prese poi le $x = QR$, corrisponderà una sola Ordinata y , RL positiva; prese poi maggiori di QR, corrisponderanno due Ordinate y , tutte e due positive, una che va alla concavità dell'Iperbola LG, l'al.

TAV. IV.
Fig. 36.

altra alla convessità dell'altra Iperbola FG; imperocchè $RL = z + 2a = y$, SG minore $= 2a + z = y$ (essendo KG inferiore $= -z$) SG maggiore $= 2a + z = y$: lo stesso si dica dell'Iperbola IH.

Se fosse $b > 2c$, il rettangolo costante sarebbe negativo: si ponga $2ac - ab = -mm$, farà la finale Equazione, ritenute già le medesime sostituzioni, $uz = -mm$: donde si descrivano le due Iperbole opposte TL, LR negli altri due angoli ABE, DBC, saranno nello stesso modo queste due Iperbole il luogo di questa ultima Equazione: imperocchè, presa alla parte opposta una qualunque $MP = ZB = -u$, farà $QP = -u - c = -x$; e condotta l'Ordinata PΩ, farà essa $= y$, essendo $ZΩ = z$, e $ZP = 2a$. Alle x pertanto negative, prese tra' punti Q, Φ, insisteranno due Ordinate y , una superiore positiva, l'altra inferiore negativa; prese $= QΦ$, insisterà una sola Ordinata positiva; e determinate maggiori di $QΦ$, insisteranno sulle x due Ordinate y , tutte due positive, l'una che va alla Iperbola TΩL, l'altra alla IΦH: che se si prenda $MP = -u < MQ$, che è $= c$, in tal caso $PQ = MQ - MP = c + u = x$: quindi anco alle x positive, prese tra i punti Q, M, insisteranno due Ordinate y , l'una superiore positiva, l'altra inferiore negativa. Quanto alla prima costruzione, abbiamo per proprietà della Curva BK·KL $= 2ac - ab$; ma $BK = MP = QP - QM = x - c$, $KL = y - 2a$; dunque $(x - c) \cdot (y - 2a) = 2ac - ab$, cioè $xy - 2ax - cy + 2ac = 2ac - ab$, ch'è lo stesso, che $xy - cy - 2ax + ab = 0$. Parimente

K 2.

men-

mente $BZ \cdot Z\Omega = 2ac - ab$; ma $BZ = MQ + PQ = c - x$; $Z\Omega$ inferiore $= -z = 2a - y$; dunque $(c - x) \cdot (2a - y) = 2ac - ab$, cioè $xy - 2ax - cy + ab = 0$, come prima.

Rispetto alla seconda costruzione $BZ \cdot Z\Omega = mm = ab - 2ac$; ma $BZ = c - x$, $Z\Omega$ superiore $= y - 2a$; dunque $(c - x) \cdot (y - 2a) = mm = ab - 2ac$, e $cy - 2ac - xy + 2ax = ab - 2ac$, cioè $xy - cy - 2ax + ab = 0$. Finalmente rispetto alla Iperbola $GR L$, $BK \cdot KL = mm = ab - 2ac$; ma $BK = x - c$, KL inferiore $= -z = 2a - y$, e però sarà $(x - c) \cdot (2a - y) = mm = ab - 2ac$, cioè $xy - cy - 2ax + ab = 0$; il che &c.



P R O B L E M A III.

47. **I**N fine tutte l'Equazioni, che si vogliano, o debbano costruire tra gli Assintoti, si comprendono generalmente sotto le seguenti:

$$\frac{g_{xx}}{b} + xy = ab \pm mx \pm ny,$$

$$xy - \frac{g_{xx}}{b} = ab \pm mx \pm ny,$$

$$\frac{g_{xx}}{b} - xy = ab \pm mx \pm ny,$$

$$-\frac{g_{xx}}{b} - xy = ab \pm mx \pm ny.$$

oppure $\frac{g_{yy}}{b} + xy = ab \pm mx \pm ny,$

$$xy - \frac{g_{yy}}{b} = ab \pm mx \pm ny,$$

$$\frac{g_{yy}}{b} - xy = ab \pm mx \pm ny,$$

$$-\frac{g_{yy}}{b} - xy = ab \pm mx \pm ny.$$

Le prime quattro sono state eccellentemente, ed ingegnosamente costruite dalla Dotto. Sig. D. Maria Gaetana Agnesi nel primo Tomo delle di lei *Analitiche Istituzioni* al num. 131., nè di esse occorre dire altro; potendo ognuno a talento sodisfarsi nel citato libro. Quanto alle ultime quattro: si pigli la prima coi segni tutti positivi, cioè $xy + \frac{g_{yy}}{b} = ab + mx$

+ ny . Si ponga $x + \frac{g_y}{b} = z$, sarà $yz = ab +$

mx

78 COSTRUZIONE DELL'EQUAZIONI

$mx + ny$; e facendo sparire la x , mettendo il di lei valore, che si cava dalla sostituzione ora fatta; ed è $x = z - \frac{gy}{b}$, avremo $zy = ab + mz - \frac{g^m y}{b} + ny$: si faccia $z - n + \frac{g^m}{b} = p$ (supponendo però $\frac{g^m}{b} - n < 0 = -c$) farà $py = ab + mz$; e sostituendo invece di z il di lei valore dato per questa ultima sostituzione, ch'è $z = p - \frac{g^m}{b} + n$, avrassi $py = ab + mp - \frac{g^m m}{b} + mn$; e fatta finalmente

FAV. IV. $y - m = q$, farà $pq = ab + mn - \frac{g^m m^2}{b}$. Sulla
Fig. 37.
retta AC si descriva il triangolo ACB a destra di AF, per essere il termine $\frac{g^m y}{b}$ positivo, e che abbia i lati $AB = b$, $BC = g$, AC nota $= f$, e l'angolo ABC sia uguale al complemento a due retti dell'angolo delle Coordinate x, y : si prolunghino AB, AC indefinitamente, e si tiri FQ parallela a BC, presa una qualunque $AQ = y$, farà $FQ = \frac{gy}{b}$, e $AF = \frac{fy}{b}$: sulla AQ si prenda AE $= m$, farà EQ $= y - m = q$; e condotta SN parallela ad EQ, ed ES pure parallela a FQ, farà $FS = \frac{fy - fm}{b} = \frac{fq}{b}$; tirata indi AD $= c = n - \frac{g^m}{b}$, parallela

ad

ad FQ, e a destra di AF, essendosi supposto $\frac{f^m}{b} =$

$n < 0 = -c$; e inoltre condotta DG indefinita parallela ad AF, tra gli Asintoti DH, LT, l'uno parallelo ad AF, l'altro a FQ, si descrivano le due

Iperbole opposte del rettangolo costante $\frac{f}{b} \cdot (ab + mn - \frac{g^{mm}}{b}) =$ al quarto proporzionale di AB,

AC, e del rettangolo costante dell'Equazione finale, saranno esse il luogo dell'Equazione proposta. Imperocchè, parlando dell'Iperbola superiore, prolungata FQ in M, e tirate le AP, PM, l'una parallela a QM, l'altra ad AQ; avremo per proprietà della Curva OG - GM = $\frac{f}{b} \cdot (ab + mn - \frac{g^{mm}}{b})$; ma

OG = FS = $\frac{fy - fm}{b}$, GM = QM + FQ -

FG = $x + \frac{gy}{b} + \frac{g^m}{b} - n$; dunque sarà $(\frac{fy - fm}{b}) \cdot (x$

$+ \frac{gy}{b} + \frac{g^m}{b} - n) = \frac{f}{b} \cdot (ab + mn - \frac{g^{mm}}{b})$,

cioè $(y - m) \cdot (x + \frac{gy}{b} - n) = ab + mn$

$- \frac{g^{mm}}{b}$; e facendo l'attuale moltiplicazione nel

primo membro, si avrà $xy + \frac{gyy}{b} = ab + mx$

$+ ny$: il che &c.

Che poi QM = AP = x , è chiaro; perchè GM = p stante l'Equazione ridotta, dunque FM

=

30 COSTRUZIONE DELL'EQUAZIONI

$$= p + c = p + n - \frac{g^m}{b} = z; \text{ e per\`o } QM = FM - FQ = z - \frac{g^y}{b} = x. \text{ Alle Assisse dunque}$$

$AP = x$ positive, corrisponderà una sola Ordinata $PM = y$ nell' Iperbola superiore positiva; e alle stesse x negative che passino la Curva ZM , ne corrisponderà un'altra PM pure positiva nell' Iperbola inferiore. Che se si prendano le x negative tra la Curva ZM , ed il punto A , corrisponderà ad esse un Ordinata negativa, che va alla convessità della stessa Iperbola ZM .

Presa $AQ < AE$, cioè $y < m$, farà $EQ = m - y = -q$; e fatta parallela FN a QE , farà SF

$$\text{inferiore} = \frac{fm - fy}{b} = -\frac{fq}{b}; \text{ onde in tal caso si}$$

dovrà rivolgere all' Iperbola inferiore: tirata adunque l' Ordinata GM , e le AP , PM , l' una parallela a GM , l' altra ad AQ , farà in questo caso l' Iperbola ZM inferiore il luogo della stessa Equazione. Imperocchè

$$OG \cdot GM = \frac{f}{b} \cdot (ab + mn - \frac{g^m m}{b});$$

$$\text{ma } OG = \frac{fm - fy}{b}, \text{ } GM = -x - \frac{gy}{b} + n -$$

$$\frac{g^m}{b}, \text{ e per\`o } OG \cdot GM = \frac{f}{b} \cdot (ab + mn - \frac{g^m m}{b})$$

$$\text{ci dar\`a } xy + \frac{g^y y}{b} = ab + mx + ny \text{ come prima.}$$

Che poi $QM = AP = -x$ anco in questo caso si vede chiaramente; imperocchè $GM = -p$; ma $QM = GM - FG + FQ$, e $GM - FG = -$
 $p -$

$$-p - c = -p - n + \frac{g^m}{b} = -z, \text{ e } FQ = \frac{g^y}{b},$$

dunque $QM = \frac{g^y}{b} - z = -x$. Se fosse $\frac{g^m}{b} - n > 0 = c$, in tal caso si tiri AD dalla parte opposta, cioè a sinistra di AF ; il che certo succede, quando l'Equazione è $\frac{g^y}{b} + xy = ab + mx - ny$.

Sia l'Equazione $xy + \frac{g^y}{b} = ab - mx + ny$; la prima sostituzione è già $x + \frac{g^y}{b} = z$, e l'Equazione diviene $zy = ab - mz + \frac{g^m}{b} + ny$, mettendo il valore di $x = z - \frac{g^y}{b}$; onde fatta la seconda sostituzione $z - \frac{g^m}{b} - n = p$, farà, facendo sparire la z , $py = ab - mp - mn - \frac{g^{mm}}{b}$; e fatta la terza $y + m = q$, avrassi finalmente $pq = ab - mn - \frac{g^{mm}}{b}$: si supponga la quantità $ab - mn - \frac{g^{mm}}{b}$ positiva, il rettangolo costante è $= \frac{f^2}{b} (ab - mn - \frac{g^{mm}}{b})$. Nella stessa posizione come pri-

TAV. IV.
Fig. 3^a.

ma si descriva il triangolo ACB coi lati $AB = b$, $BC = g$, e sia la nota $AC = f$; e l'angolo $ABC =$ al complemento a due retti di quello delle Coordinate x, y ; prodotte le AB, AC fino in Q, F , si tiri

L
FQ

82 COSTRUZIONE DELL'EQUAZIONI

FQ parallela a BC, sarà $FQ = \frac{gy}{b}$ (presa prima $AQ = y$) e $AF = \frac{fy}{b}$; si prolunghino le AB, AC al di sotto, e si prenda $AR = m$; sicchè tirata RO parallela a BC, sarà $AO = \frac{fm}{b}$; quindi avremo $FO = \frac{fy + fm}{b} = \frac{fq}{b}$; dipoi presa OS = $n + \frac{gm}{b}$, essendo nella sostituzione questa quantità negativa; fra gli Assintoti GG, LL, l'uno parallelo ad OF, l'altro a FQ si descrivano le due Iperbole opposte MD, MD, faranno esse il luogo dell'Equazione proposta: imperocchè $SG \cdot GM = \frac{f}{b} \cdot (ab - mn - \frac{gmm}{b})$; ma $SG = FO = \frac{fy + fm}{b}$, $GM = QM + FQ - FG$, e $QM = x$, $FQ = \frac{gy}{b}$, $FG = n + \frac{gm}{b}$; sostituendo dunque tali valori, e moltiplicando attualmente, troveremo l'Equazione, che s'è costruita. Rispetto alla Iperbola inferiore si prenda AP dalla parte opposta, prolungata AQ all'ingiù, e condotte PM parallela ad AQ, e l'Ordinata GM, sarà nello stesso modo $SG \cdot GM = \frac{f}{b} \cdot (ab - mn - \frac{gmm}{b})$; ma $SG = DG - DS = AF - AO = -\frac{fy - fm}{b}$, $GM = GF + FQ$
+

+ MQ, e GF = $n + \frac{g^m}{b}$, FQ = $-\frac{g^y}{b}$, M Q = $-x$; dunque $(\frac{-fy - fm}{b}) \cdot (n + \frac{gm}{b} - \frac{gy}{b} - x)$
 = $\frac{f}{b} \cdot (ab - mn - \frac{gmm}{b})$ ci darà medesimamente la
 Equazione, che ora si è costruita. Alle Assisse AP =
 x positive, tra il punto A, e la Curva MD, e nega-
 tive, corrisponderanno due Ordinate PM = y, l'una
 che va alla Iperbola superiore, positiva; l'altra nega-
 tiva nell'Iperbola inferiore: prese le x positive di là
 dalla Curva MD, insisterà ad esse un' Ordinata nega-
 tiva, che va alla concavità dell'Iperbola superiore.

Sia l'Equazione $xy + \frac{g^y y}{b} = ab - mx - ny$;
 la prima sostituzione è già $x + \frac{gy}{b} = z$, la secon-
 da $z + n - \frac{gm}{b} = p$, e la terza $y + m = q$; on-
 de l'Equazione finale diviene $pq = ab + mn - \frac{gmm}{b}$;
 ed il rettangolo costante = $\frac{f}{b} \cdot (ab + mn - \frac{gmm}{b})$.
 Si prenda OS = c = $\frac{gm}{b} - n$ a destra di OF, se
 $n - \frac{gm}{b} < 0 = -c$, e a parte sinistra, se $n -$
 $\frac{gm}{b} > 0 = c$: ed il resto si eseguisca con l'ordine
 sin' ora tenuto.

Fin qui si è supposto il rettangolo costante quantità
 L. 2. posi-

84 COSTRUZIONE DELL'EQUAZIONI

positiva; ma quando anche fosse negativa, non può fare veruna alterazione, avvertendo solo di descrivere le due Iperbole negli altri due angoli relativamente al rettangolo costante, tirando alla parte destra, o sinistra di OF, la linea $AD = OS$, secondo i casi già considerati. Resta adunque generalmente costruita la prima delle quattro Equazioni proposte

$$xy + \frac{g^2 y^2}{b} = ab \pm mx \pm ny.$$

La seconda Equazione è $xy - \frac{g^2 y^2}{b} = ab \pm mx \pm ny$, la quale abbia nell' omogeneo di comparazione tutti i termini col segno positivo, cioè sia $xy - \frac{g^2 y^2}{b} = ab + mx + ny$; si faccia la sostituzione di $x - \frac{g^2 y}{b} = z$, e sarà $yz = ab + mz + \frac{g^2 y^2}{b} + ny$; e ponendo $z - \frac{g^2 y}{b} - n = p$, si avrà $py = ab + mp + \frac{g^2 y^2}{b} + mn$; e fatta l'ultima sostituzione di $y - m = q$, sarà $pq = ab + \frac{g^2 y^2}{b} + mn$. A si-

TAV. IV. sinistra di AF, avendo posto $x - \frac{g^2 y}{b} = z$, si descri-

va il triangolo ABC con i lati $AB = b$, $BC = g$, e sia la nota $AC = f$, e l'angolo $ABC =$ all' angolo delle Coordinate x, y ; si prolunghino AB, AC; si determini $AQ = y$, poscia si tiri QF parallela a BC,

BC, sarà essa $= \frac{gy}{b}$; si tagli dalla AQ, AE = m ,
 indi condotta RN parallela a QE, sarà NR = $y - m$,
 e RF = $\frac{fy - fm}{b}$: si guidino le rette AP, PM,
 l'una parallela a QF, l'altra ad AQ; dipoi prolun-
 gata la QF fino in M, e presa nella AP, AD =
 $\frac{gm}{b} + n$, fra gli Asintoti HH, LL, l'uno parallelo
 ad AF, l'altro a QM, si descrivano le due Iperbo-
 le opposte MS, MS del rettangolo costante $\frac{f}{b} \cdot (ab + \frac{gmm}{b} + mn)$,
 faranno esse il luogo della Equa-
 zione proposta: imperciocchè OG · GM = $\frac{f}{b} \cdot (ab + \frac{gmm}{b} + mn)$;
 ma OG = RF = $\frac{fy - fm}{b}$,
 GM = $x - \frac{gy - gm}{b} - n$; sostituendo questi valo-
 ri, e moltiplicando attualmente, si troverà l'Equa-
 zione costruita.

Presa AQ < AE, cioè $y < m$, sarà EQ =
 $m - y = -q$, e OG inferiore = FR = $-\frac{fq}{b}$
 = $\frac{fm - fy}{b}$; GM Ordinata all'Iperbola inferiore =
 $-x + \frac{gy + gm}{b} + n$; sicchè mettendo di nuovo que-
 sti

86 COSTRUZIONE DELL'EQUAZIONE

sti valori in luogo di OG , MG , si troverà ancora la medesima Equazione. Che poi $QM = AP = x$ rispetto all'Iperbola superiore, si vede chiaramente;

perchè $GM = p$; ma $FG = \frac{g^m}{b} + n$, dunque FM

$= p + \frac{g^m}{b} + n = z$; ma in oltre è $QF = \frac{g^y}{b}$,

dunque $QM = z + \frac{g^y}{b} = x$: riguardo poi all'

Iperbola inferiore, $GM = -p$ stante già l'Equa-

zione ridotta; ma $FG = \frac{g^m}{b} + n$, e $QF = \frac{g^y}{b}$, dun-

que $QM = -p - \frac{g^m}{b} - n - \frac{g^y}{b} = -z$ —

$\frac{g^y}{b} = -x$, essendo $-p - \frac{g^m}{b} - n = -z$. Ri-

spetto alla corrispondenza delle Ordinate y , si offervi ciò, che si è detto al §. 3. di questo numero.

Sia la Equazione $xy - \frac{g^y y}{b} = ab - mx + ny$:

la prima sostituzione è di $x - \frac{g^y}{b} = z$, e si ha yz

$= ab - mz - \frac{g^m y}{b} + ny$; la seconda di $z +$

$\frac{g^m}{b} - n = p$, e farà $py = ab - mp - mn +$

$\frac{g^m m}{b}$; la terza di $y + m = q$, e avremo finalmente

$pq = ab + \frac{g^m m}{b} - mn$. Sia $\frac{g^m}{b} - n < 0 = -c$.
Sul-

Sulla retta AF a sinistra si descriva il triangolo ABC , TAV. IV. fig. 40.
 coi lati $AB = b$, $BC = g$, e sia la nota $AC = f$, e l'angolo

$\angle ABC =$ all'angolo delle Coordinate x , y : sulla
 AB prodotta si prenda $AQ = y$, e condotta QF pa-

rallela a BC , farà $QF = \frac{gy}{b}$; si tiri $AD = c =$

$n - \frac{gm}{b}$ a destra di AF (essendo $\frac{gm}{b} - n < 0 =$

$-c$) e parallela a QF , e sia prodotta in P : di poi
 si guidi PM , parallela ad AQ : si prolunghi QF in
 M : e si produca in oltre AB in E , e sia $AE =$
 m : oltre a ciò si prolunghi la AC in R , onde RE
 sia parallela a BC : finalmente prodotta la RE in
 O , col centro O , fra gli Assintoti GG , LL ,
 l'uno parallelo a RF , l'altro a QM , si descriva-
 no le due Iperbole opposte MS , MS del rettango-

lo costante $= \frac{f}{b} \cdot (ab + \frac{gmm}{b} - mn)$, saranno ef-

fe il luogo dell'Equazione proposta. Imperocchè

la proprietà della Curva ci dà $OG \cdot GM = \frac{f}{b} \cdot (ab$

$+ \frac{gmm}{b} - mn)$; ma $OG = AF + AR =$

$\frac{fy + fm}{b}$, $GM = x - \frac{gy + gm}{b} - n$; dunque &c. Che

$QM = AP = x$, si vede chiaramente; perchè
 GM

38 COSTRUZIONE DELL'EQUAZIONI

GM = p per l'Equazione ridotta; ma FG = n - $\frac{g^m}{b}$, dunque FM = $p + n - \frac{g^m}{b} = z$; ma è pure QF = $\frac{g^y}{b}$, onde QM = FM + QF = $z + \frac{g^y}{b} = x$. Presa AQ = -y, farà QF = - $\frac{g^y}{b}$, GM = -p, FG = $n - \frac{g^m}{b}$; quindi FM = $n - \frac{g^m}{b} + p = z$, e però QM = $-\frac{g^y}{b} - z = -x$. Anche in questo caso OG · GM = $\frac{f}{b} \cdot (ab + \frac{g^{mm}}{b} - mn)$; ma OG = AF - AR = $-\frac{fy - fm}{b}$, GM = FG - FM; ora FG = $n - \frac{g^m}{b}$, FM = $-\frac{g^y}{b} + x$, dunque GM = $n - \frac{g^m}{b} - x + \frac{g^y}{b}$; e però ancora $(-\frac{fy - fm}{b}) \cdot (n - \frac{g^m}{b} + \frac{g^y}{b} - x) = \frac{f}{b} \cdot (ab + \frac{g^{mm}}{b} - mn)$ ci restituisce l'

Equazione proposta: in quanto poi alla corrispondenza delle Ordinate y, si noti ciò, che s'è detto al §. 5. di questo numero. Che se $\frac{g^m}{b} - n > 0 = c$; si tiri AD = $c = \frac{g^m}{b} - n$ a sinistra di AF, e
nel

nel rimanente s'offervi ciò, che fin ora si è fatto.

Il termine ab fu preso sempre positivo; ma se si prenda anche negativo, niuna alterazione può fare, se non che rendere negativo il rettangolo costante dell'Equazioni ridotte; il qual caso è già stato costruito.

Le due ultime Equazioni sono

$$\frac{xy}{b} - xy = ab \pm mx \pm ny,$$

$$-\frac{xy}{b} - xy = ab \pm mx \pm ny;$$

mutando i segni faranno,

$$xy - \frac{xy}{b} = -ab \mp mx \mp ny,$$

$$xy + \frac{xy}{b} = -ab \mp mx \mp ny;$$

ma questa è stata costruita nel costruire la prima, e l'altra nel costruire la seconda; e però generalmente sono state costruite le quattro Equazioni da prima proposte: il che era da farsi.

48. Finalmente non lascio d'avvertire, che tutte le quattro ultime Equazioni espote al num. antecedente si possono anche costruire colla stessa Iperbola riferita a' suoi Diametri. Si prenda la prima Equazione di tal numero (e già ciò, che si prova di una, si verifica anco delle altre) colli segni tutti positivi, cioè $\frac{xy}{b} + xy = ab + mx + ny$; libe-

rando dalla frazione il quadrato yy , farà $yy + \frac{bxy}{g}$
 $= \frac{abb + bmx + bxy}{g}$, Equazione all'Iperbola refe-
 rita a' suoi Diametri (num. 39.). Se il quadrato yy
 fosse negativo, si renda positivo colla trasposizione
 de' termini.

IL FINE.

TA.

TAVOLA DE' CAPI

DELL' OPERA.

C A P O P R I M O.

Dell' Equazioni alla Parabola. Pag. 5

C A P O S E C O N D O.

Dell' Equazioni all' Ellissi. Pag. 27

C A P O T E R Z O.

Dell' Equazioni all' Iperbola, o Iperbole opposte. Pag. 48

C A P O Q U A R T O.

Dell' Equazioni all' Iperbola fra gli Affintoti. Pag. 72



THE TAVOLLA

OF THE

CAPITOL

OF THE

CAPITOL

OF THE

CAPITOL





OF THE

CAPITOL

OF THE









TAB. I







Valeri inc.



34.4.19.



Valeri inc.



Valesi inc.

TAB. IV




Fig. 34




Fig. 35




Fig. 33




Fig. 38




Fig. 39

Valesi inc.





